

登録速報（新規登録）

農 薬 名：ファーストオリゼフェルテラ粒剤

登 録 番 号：第22824号

新 規 登 録 日：平成22年11月10日

【適用病害虫の範囲及び使用方法】

作物名	適 用 病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使 用 回 数	使用方法	クアントレリ プロール を含む 農薬の総 使用回数	プロバナ ールを含む 農薬の総 使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病 イネズグムシ イネノオムシ ニカメチュウ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1箱当り 50g	は種時 (覆土前)	1回	育苗箱の 床土に 均一に 散布する	1回	2回以内 (育苗箱 への処理 及び側条 施用は合 計1回以 内)

【使用上の注意事項】

- (1) 本剤処理後の低温で生育抑制を生じる恐れがあるので温度管理に注意し、適切な育苗につとめること。
- (2) 本剤の処理により、軽度の初期生育遅延や葉の黄化を認めることがあるが、その後回復するので通常の管理を維持すること。
- (3) 本田の整地が不均整な場合は薬害を生じやすいので、代かきはていねいに行い、移植後に田面が露出したりしないよう水管理に注意すること。
- (4) 本田が砂質土壌の水田や漏水田、未熟有機物多用田の場合は使用をさけること。
- (5) 移植後、低温が続く、苗の活着遅延が予測される場合は使用をさけること。
- (6) 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないよう注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法】

- (1) 誤食などのないよう注意すること。
誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。
- (2) 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (3) 散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用すること。
作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換すること。
- (4) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (5) かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触を避けること。
- (6) 夏期高温時の使用を避けること。

【水産動植物に有毒な農薬については、その旨】

- (1) 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意すること。
- (2) 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。

【貯蔵上の注意事項】

直射日光を避け、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。