

動物用医薬品

パンテチン製剤

イブコン[®]注10%

Ipcon[®] Injection 10%

イブコン注10%はパンテチンを10%含有する動物用注射剤です。

本物質は蛋白質・脂肪・炭水化物の代謝、アセチル化やグリシン抱合などの薬物解毒およびアセチルコリンやステロイドの生合成を司る補酵素(CoA)の前駆物質として重要な役割を果たすことが知られています。

パンテチンの薬理作用は血清コレステロール低下作用、血清HDL-コレステロール増加作用、脂肪酸酸化促進作用のほか胃腸運動亢進作用等が認められており、ヒトの臨床においては脂質代謝異常改善剤、便秘、開腹手術後の腸管麻痺の改善剤として広く活用されています。

イブコン注10%は動物において、牛の消化器病および開腹手術後の消化器機能低下に対する治療剤として有用性が認められております。また主成分のパンテチンはCoA前駆物質であるため残留性に問題がなく、安全性が高く、開腹手術後の衰弱時および妊娠中の牛にも投与が可能であり、臨床の場で使い易い注射剤です。

【成分・分量】

イブコン注10%は1mL中にパンテチン100mgを含有する注射剤です。

【効能・効果】

牛：前胃アトニー、食滯、後胃アトニー、開腹手術後の食欲不振及び胃腸運動低下

【用法・用量】

通常1日1回体重1kg当たり本剤として下記の量を1～3日間静脈内に注射する。

牛：0.05～0.1mL

【使用上の注意】

〈一般的注意〉

- (1) 本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
- (2) 本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- (3) 本剤は獣医師の指導の下で使用すること。

〈使用者に対する注意〉

誤って人に注射した場合は、直ちに医師の診察を受けること。

〈牛に対する注意〉

- 1 制限事項
本剤は腸管結石症及び胃腸管捻転の疑いのある牛には使用しないこと。
- 2 副作用
副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

3 適用上の注意

- (1) 注射器具は滅菌されたものを使用すること。
- (2) アンプルカット時の異物混入を避けるため、エタノール消毒綿等で清拭しカットすること。
- (3) 使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- (4) 本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- (5) 使用済みの注射針は、針回収用の専用容器に入れること。針回収用の容器の廃棄は、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を有した業者に委託すること。

※本品は、「ワンポイントカットアンプル」を使用していますので、アンプル枝部のマークを上にして、反対方向に折りとってください。

〈保管上の注意〉

- (1) 小児の手の届かないところに保管すること。
- (2) 本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。
- (3) 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。

貯 法 室温保存

有効期間 使用の期限は容器および外装に記載

【包 装】

イブコン注10% (1mL中100mg含有) 20mL×10 (アンプル入り)

販売元

Meiji Seika ファルマ株式会社

東京都中央区京橋2-4-16

製造販売元

テバ製薬株式会社

名古屋市千区太閤一丁目24番11号