

動物用医薬品 畜産・水産用

水溶性複合ビタミン製剤

パンカル® G 散

Pancal® G Powder

パントテン酸は、動物の代謝に必要な物質であるCo-enzymeA となり、ステロイド、脂肪酸、ポルフィリンなどの生体にとって欠くことの出来ない物質の合成に関与するとともに、脂肪、蛋白質、炭水化物の代謝にも関与するなど重要な役割を果たしています。

パンカルG散は、このパントテン酸を主剤に、協同作用を営むビタミンB₂、B₆、ニコチン酸アミドを配合した複合ビタミン剤です。

〔 成 分 ・ 分 量 〕

パンカルG散は、100 g 中下記の成分を含有する。

パントテン酸カルシウム	1,000mg
リボフラビン (ビタミンB ₂)	30mg
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	300mg
ニコチン酸アミド	150mg

〔 効 能 ・ 効 果 〕

家畜・家禽

1. 水溶性ビタミンの補給
2. 水溶性ビタミン欠乏による下記疾病(症状)の予防と治療
 - 牛 : 肝機能障害, ケトージス
 - 豚 : 皮膚疾患, 繁殖障害
 - 犬, 猫 : 皮膚疾患
 - 鶏 : 産卵率の低下

魚 類

1. 魚類の水溶性ビタミンの補給
2. 魚類の水溶性ビタミン欠乏による疾病(症状)の予防と治療

〔 用 法 ・ 用 量 〕

家畜・家禽

体重 1 kg 当たり下記量を 1 日量として経口投与する。

馬	: 0.1g
牛	: 0.2~0.4g
豚	: 0.5~1g
犬, 猫	: 0.5~5g

飼料に混和して投与する場合には、混和率を下記のとおりとする。

豚 : 0.3~2%

鶏 : 2%

魚 類

魚類に対しては、魚体重 1kg 当たり 1日量として本剤 0.2~2g を飼料に混ぜて連続投与する。

〔使用上の注意〕

【一般的注意】

- (1) 本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- (2) 本剤は効能・効果において定められた適応症の治療にのみ使用すること。

【保管上の注意】

- (1) 小児の手の届かないところに保管すること。
- (2) 直射日光、高温及び多湿を避け、密閉して保管すること。

有効期間：3年（使用の期限は外装に記載）

〔包 装〕

パンカルG散

20kg（1kg×20分包）

製造販売元



Meiji Seika ファルマ株式会社

東京都中央区京橋 2 - 4 - 16