

要指示**動物用医薬品****カナマスチン[®] ディスポ**

硫酸カナマイシン・ベンジルペニシリンプロカイン油性乳房注入剤

KANAMASTIN DISPO FOR MASTITIS

カナマスチンディスポはベンジルペニシリンと硫酸カナマイシンを配合した無刺激性の乳房注入剤です。ベンジルペニシリンはブドウ球菌、レンサ球菌等の乳房炎起因菌に、硫酸カナマイシンはこれらのグラム陽性菌のほかに大腸菌等のグラム陰性菌に強い抗菌力を示す抗生物質です。両者を配合することにより、殺菌作用における相乗効果が得られ、抗菌スペクトルが拡大します。

成分・分量

本品1容器(3g)中

有効成分	日局 硫酸カナマイシン 局外規 ベンジルペニシリンプロカイン	300mg(力価) 300,000単位
着色剤	食添 食用青色1号	25mg

効能・効果

適応症

牛：泌乳期の乳房炎

用法・用量

1日1回1乳房当たり、本剤として下記の量を乳房内に注入する。

牛：1容器

使用上の注意**【一般的注意】**

- (1)本剤は要指示医薬品であるので獣医師の処方せん・指示により使用すること。
- (2)本剤は効能・効果において定められた適応症の治療にのみ使用すること。
- (3)本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- (4)本剤の使用に当たっては、適応症の治療上必要な最小限の期間に止めることとし、週余にわたる連続投与は行わないこと。
- (5)本剤は、「使用基準」の定められるところにより使用すること。

【対象動物に対する注意】

制限事項

本剤の有効成分であるペニシリンは、過敏症反応をまれに起こすことがあるので、投与前に使用経歴や反応の有無を調べ、陽性動物には投与を避けること。

【保管上の注意】

小児の手の届かないところに保管すること。

注意－獣医師の処方せん・指示により使用すること

取扱い上の注意

- (1) 貯 法 室温保存
- (2) 有効期間 最終有効年月はラベル又は外箱に記載
- (3) 規制区分 指定医薬品、要指示医薬品、使用規制該当医薬品



注意：本剤は薬事法第83条の4の規定に基づき上記の用法及び用量を含めて使用者が遵守すべき基準が定められた動物用医薬品ですので、牛について上記の用法及び用量並びに次の使用禁止期間を遵守してください。

牛：食用に供するためにと殺する前50日間又は食用に供するために搾乳する前96時間

使用方法

搾乳を完全にしてから、次の順序で、乳房内に注入して下さい。

1. 乳頭をよく消毒して下さい。
2. 注入針の長さは次の2通りが選択できます。注入針には手を触れないようにして下さい。
 - ①注入針を長くする場合：注入針のカバー全体を押し曲げて外す(下図①)。
 - ②注入針を短くする場合：注入針カバーの先端を上から押さえ、人差し指でカバーの根本を保持し、先端を押し曲げて取る(下図②)。



3. 注入針を乳頭に挿入し、シリンジを押しして全量を乳房内に注入して下さい。

包 装

動物用医薬品 カナマスチンディスプレイスポ 1箱中、24本入り

#0411A(NLK3D)

製 造 元 Norbrook Laboratories Limited (英国)

製造販売元 **Meiji Seika ファルマ株式会社**

(輸入) 東京都中央区京橋 2 - 4 - 16