

使用前に必ず本書を読み、内容を理解したうえで使用してください。
また、本書を必要なときに参照できるように大切に保管してください。

動物用医薬品 プロスタグランジンF_{2α}類縁体制剤

劇 **オンステージ[®]S**

本剤は、プロスタグランジンF_{2α}合成類縁体であるクロプロステノールを主成分とした製剤です。クロプロステノールには黄体退行作用、子宮収縮作用があることから、豚では分娩誘発の目的で使用されます。

【成分及び分量】

本剤1mL中

クロプロステノールナトリウム …………… 92 μg

(クロプロステノールとして…………… 87.5 μg)

【効能又は効果】

豚：分娩誘発

【用法及び用量】

1頭当たり2mLを妊娠末期(112日又は113日)に1回筋肉内に注射する。

【使用上の注意】

一般的注意

- (1) 本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方せん・指示により使用すること。
- (2) 本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
- (3) 本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- (4) 本剤は、「使用基準」の定めるところにより使用すること。

注意：本剤は薬事法第83条の4の規定に基づき上記の用法及び用量を含めて使用者が遵守すべき基準が定められた医薬品ですので、豚について上記の用法及び用量並びに次の使用禁止期間を遵守して下さい。

豚：食用に供するためにと殺する前7日間

使用者に対する注意

- (1) 妊娠中の女性、喘息患者、気管支その他呼吸器系に障害のある者に、投与作業を行わせないこと。
- (2) 誤って注射された者は、直ちに医師の診察を受けること。
- (3) 本剤は皮膚から吸収されるので、皮膚に付着した場合は直ちに水洗いすること。
- (4) 本剤が誤って使用者等の眼、鼻、口等に入ったときは、直ちに水で洗浄やうがい等を行い医師の診察を受けること。

豚に対する注意

1 制限事項

本剤の投与に当たっては、分娩予定を確実に把握して投与すること。

2 副作用

副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

3 適用上の注意

- (1) 本剤は他の薬剤と混合して使用しないこと。
- (2) 本剤は必ず筋肉内に使用し、注射時に注射針が血管あるいは臓器内に入っていないことを確認してから投与すること。
- (3) 注射器具は滅菌されたものを使用すること。
- (4) 注射針は必ず1頭ごとに取りかえること。

Meiji Seika Pharma Co., Ltd.

取扱い上の注意

- (1) 本剤の外観又は内容物に異常が認められた場合は使用しないこと。
- (2) 本剤を分割使用する場合は速やかに使用すること。
- (3) プラスチック容器は、液漏れの原因になるので鋭利なもの等で傷つけないこと。
- (4) プラスチック容器に注射針を刺すときは、ゴム栓の刻印部にまっすぐに刺通すること。斜めに刺すと、側壁を刺通し液漏れの原因になることがあるので注意すること。
- (5) 使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- (6) 本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- (7) 使用済みの注射針は、針回収用の専用容器に入れること。針回収用の容器の廃棄は、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を有した業者に委託すること。
- (8) 本剤は有効期間を設定してある動物用医薬品なので使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

保管上の注意

- (1) 小児の手の届かないところに保管すること。
- (2) 本剤の保管は直射日光及び高温を避けること。

【貯蔵方法】

密封容器

【使用期限】

ラベル・個箱に記載

【包装】

20mL プラスチックバイアル

販売元



Meiji Seika ファルマ株式会社
東京都中央区京橋 2-4-16

製造販売元



フジタ製薬株式会社
東京都品川区上大崎2丁目13番2号

Meiji Seika Pharma Co., Ltd.