

要指示

動物用医薬品
スルファドキシシ・トリメトプリム配合注射剤

プリミドキシシ[®]
PRIMIDOXINE[®]

プリミドキシシは、サルファ剤スルファドキシシと抗菌剤トリメトプリムを5：1の比率で配合した筋注用注射剤です。抗菌力が相乗的に増大し、豚のヘモフィルス感染症および細菌性下痢症にすぐれた効果を発揮します。

成分・分量

本剤は1 mL中に次の成分を含有します。

スルファドキシシ 200mg

トリメトプリム 40mg

効能・効果

豚：細菌性下痢症
ヘモフィルス感染症

用法・用量

1日1回、体重1 kg当たり下記の量を筋肉内に（ヘモフィルス感染症については1～3日間）注射する。

豚（4ヵ月齢を超える豚を除く）：0.1～0.2mL

使用上の注意**【一般的注意】**

- (1) 本剤は要指示医薬品であるので獣医師の処方せん・指示により使用すること。
- (2) 本剤は効能・効果において定められた適応症の治療にのみ使用すること。
- (3) 本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- (4) 本剤の使用に当たっては、適応症の治療上必要な最小限の期間の投与に止めることとし、週余にわたる連続投与を行わないこと。
- (5) 本剤は、「使用基準」の定められるところにより使用すること。

【使用者に対する注意】

誤って人に注射した場合は、直ちに医師の診察を受けること。

【対象動物に対する注意】

1. 制限事項

本剤は4ヵ月齢を超える豚には使用しないこと。

2. 副作用

本剤は局所反応を起こすことがある。

3. 適用上の注意

本剤の有効成分であるトリメトプリムは、実験動物で催奇形作用が認められているので、使用にあたっては慎重を期すこと。

【取扱い上の注意】

- (1) よく振り混ぜてから使用すること。
- (2) 使用済みの空容器は医療廃棄物として処分すること。

【保管上の注意】

- (1) 小児の手の届かないところに保管すること。
- (2) 0℃以下及び急激な温度変化を避けること。
- (3) 経時的に色調が若干濃くなりますが、有効成分に変化は認められません。

注 意－獣医師の処方せん・指示により使用すること。

注 意：本剤は薬事法第83条の4の規定に基づき上記の用法及び用量を含めて使用者が遵守すべき基準が定められた動物用医薬品ですので、豚について上記の用法及び用量並びに次の使用禁止期間を遵守してください。

豚：食用に供するためにと殺する前10日間

取扱い上の注意事項

貯 法：遮光室温保存

有効期間：24ヵ月（使用の期限はバイアル及び外箱に記載）

包 装

1 バイアル中

100mL入り

製 造 元 ノルブルックラボラトリーズLtd.

製造販売元 Meiji Seika ファルマ株式会社
(輸入) 東京都中央区京橋 2 - 4 - 16

#0411A(PXMA)