

**要指示**

貯法	室温保存
有効期間	18ヵ月（最終有効年月はバイアル及び外箱に記載）
規制区分	指定医薬品、要指示医薬品、使用規制該当医薬品

**動物用医薬品****懸濁水性プロカインペニシリンG明治**

ベンジルペニシリンプロカイン水性懸濁注射液  
PROCAINE PENICILLIN G MEIJI IN AQUEOUS SUSPENSION  
FOR VETERINARY USE

懸濁水性プロカインペニシリンG明治はベンジルペニシリンプロカインを有効成分とする、筋注用の懸濁水性注射液です。

**【成分・分量】**

本剤1 mL中に下記成分を含有します。

有効成分	ベンジルペニシリンプロカイン	30万単位
------	----------------	-------

**【特長】**

- ベンジルペニシリンプロカインは主としてグラム陽性菌に強い抗菌作用を示します。
- ウサギによる実験から、筋注後、腎臓、血清、肺、皮膚、心臓および脾臓に高い組織内濃度が認められています。

**【効能・効果】****有効菌種**

本剤感受性の次の菌種：ブドウ球菌、レンサ球菌、コリネバクテリウム、豚丹毒菌、ヘモフィルス、パストツレラ

**適応症**

牛：肺炎、気腫疽、放線菌症、乳房炎、術後感染症の予防  
馬：腺疫、精囊炎、骨膜骨髓炎  
豚：肺炎、豚丹毒、創傷感染

**【用法・用量】**

1日1回体重1 kg当たり、ベンジルペニシリンプロカインとして下記の量を筋肉内に注射する。  
牛：4,000～5,000単位 ただし、乳房炎の治療には10,000～15,000単位、術後感染症の予防には1頭当たり100,000～200,000単位を術部に注射する。  
馬：4,000～5,000単位  
豚：4,000～5,000単位 ただし、豚丹毒の治療には50,000単位

**【使用上の注意】****【一般的注意】**

- 本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方せん・指示により使用すること。
- 本剤は効能・効果において定められた適応症の治療にのみ使用すること。
- 本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- 本剤の使用に当たっては、適応症の治療上必要な最小限の期間の投与に止めることとし、過剰にわたる連続投与は行わないこと。
- 本剤は「使用基準」の定めるところにより使用すること。

### 【使用者に対する注意】

- (1) 誤って人に注射した場合は、直ちに医師の診察を受けること。
- (2) 本剤の成分またはペニシリン系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある人は使用を避けるか慎重に使用すること。

### 【対象動物に対する注意】

#### 1 制限事項

本剤はβ-ラクタム系の抗生物質であるので、同系薬（ペニシリン等）に対する過敏症の有無を調べ、陽性動物や既往歴のある動物には使用しないこと。

#### 2 副作用

- (1) 副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。
- (2) 本剤は過敏症反応（ショック、発熱、発疹、蕁麻疹等）を起こすことがある。過敏症反応があらわれた場合は、直ちに投与を中止し、すぐに獣医師にかかること。  
強心剤、気管拡張剤、昇圧剤、抗ヒスタミン剤やコーチゾン等の投与及び輸液、人工呼吸等、症状に応じた適切な処置を行うこと。
- (3) 注射部位に疼痛、硬結をみることがある。

#### 3 適用上の注意

- (1) 本剤はペニシリナーゼ産生菌には通常奏効しないので、この場合は他の薬剤を使用すること。
- (2) 注射針を刺入したとき疼痛を訴えたり、血液の逆流をみた場合には直ちに針を抜き、部位を変えて注射すること。
- (3) 連続して使用する場合には注射部位を変えること。

### 【取扱い上の注意】

- (1) 用時よく振とうし、均一な懸濁液として使用すること。
- (2) 懸濁注射液を注射筒に吸入後そのまま放置すると針づまりを起こすことがあるので、その場合は針をとりかえ、注射筒をよく振ること。
- (3) 使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。

### 【保管上の注意】

小児の手の届かないところに保管すること。

**注意—獣医師等の処方せん・指示により使用すること**

**注意：本剤は薬事法第83条の4の規定に基づき上記の用法及び用量を含めて使用者が遵守すべき基準が定められた動物用医薬品ですので、牛、馬、豚について上記の用法及び用量並びに次の使用禁止期間を遵守して下さい。**

牛：食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前96時間

馬：食用に供するためにと殺する前14日間

豚：食用に供するためにと殺する前14日間

### 【包 装】

動物用医薬品 懸濁水性プロカインペニシリンG明治  
1バイアル中

20mL（600万単位）×10本入

100mL（3000万単位）

製造販売元



Meiji Seika ファルマ株式会社  
東京都中央区京橋 2-4-16

#0411A (SAPD)