

# 登録速報（適用拡大）

農 薬 名：ジベレリン明治液剤

登 録 番 号：第6005号

適用拡大登録日：平成22年2月18日

適用拡大登録内容：農薬登録申請書第7項「適用病害虫の範囲及び使用方法」に以下を追加する。作物名「温州みかん」、使用目的「浮皮軽減」を追加し、現行の記載を【変更後】のとおりとする。

## 【変更後の適用作物・使用目的と使用方法】

作物名	使用目的	使用濃度	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジベレリンを含む農薬の総使用回数
かんきつ (不知火、ぼんかん、かぼす、はるみ、ワシントンネーブル、日向夏、すだち、平兵衛酢、長門ユズキチ(無核)、 <b>温州みかん</b> を除く)	花芽抑制による樹勢の維持	ジベレリン 25～50ppm	収穫直後～ 収穫約1ヶ月後	1回	立木全面散布 又は枝別散布	1回
	落果防止		開花始め～満開10日後		散布	
温州みかん	<b>花芽抑制による樹勢の維持</b>	ジベレリン 25～50ppm	収穫直後～ 収穫約1ヶ月後		立木全面散布 又は枝別散布	
	<b>落果防止</b>		開花始め～満開10日後		散布	
	浮皮軽減	ジベレリン 3.3～5ppm	収穫予定日の3ヶ月前 但し、収穫45日前まで		果実散布 (プロヒドロジャスモン 1000～2000倍液に加用)	

## 【使用上の注意:温州みかん】

### <浮皮軽減>

- ① 本剤処理により着色が遅延することがあるため、貯蔵用の温州みかんで使用すること。
- ② 本剤処理により薬斑が残ることがあるため、使用に当たっては病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。