

# 園芸用殺虫剤

## 明治 ファインセーブ® フロアブル

フロメトキン…………… 10.0%  
水、界面活性剤等 …………… 90.0%

農林水産省登録 第 24069 号

【毒性】医薬用外劇物 【有効年限】4年 【包装】500ml × 20本

### ●特 長

1. アザミウマ類に特効的・サビダニ類にも高い効果があります。  
併せて、タバココナジラミ類、小型のチョウ目害虫にも有効です。
2. 新規作用機作で既存剤に感受性の低下した害虫に有効です。  
ミトコンドリア電子伝達系複合体Ⅲ Qiを阻害します。
3. ミツバチ・マルハナバチ・カブリダニ類等に対して影響が小さいです。
4. 極めて高い速効性・優れた残効性があります。

### ●適用病害虫および使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フロメトキンを含む農業の総使用回数
かんきつ	ミカンサビダニ	2000 ~ 4000倍	200 ~ 700ℓ /10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
	アザミウマ類	2000倍					
なす	タバココナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミを含む)	1000倍	100 ~ 300ℓ /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	アザミウマ類	1000 ~ 2000倍					
トマト	トマトサビダニ	1000 ~ 4000倍					
	タバココナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミを含む)	1000 ~ 2000倍					
ミニトマト	トマトサビダニ	1000倍					
	アザミウマ類	1000 ~ 2000倍					


作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	フロメトキンを含む 農薬の総使用回数									
ピーマン	タバコナジラミ類 (シルバーリーフコナ ジラミを含む)	1000倍	100～300ℓ /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内									
すいか いちご	アザミウマ類	1000～ 2000倍		収穫7日前まで	2回以内		3回以内	2回以内								
はくさい	アオムシ コナガ	1000倍														
キャベツ	コナガ アザミウマ類	1000～ 2000倍		収穫3日前まで	2回以内				3回以内	2回以内						
		アオムシ														
ブロッコリー カリフラワー	アオムシ アザミウマ類	1000倍		収穫14日前まで							2回以内	3回以内	2回以内			
だいこん	コナガ	1000～ 2000倍														
にら	アザミウマ類	2000倍		収穫3日前まで										3回以内	2回以内	
アスパラガス				100～800ℓ /10a												収穫前日まで
わけぎ あさつき				ネギハモグリバエ												
ねぎ	アザミウマ類	1000～ 2000倍	100～300ℓ /10a	収穫3日前まで		3回以内										2回以内
たまねぎ			2000倍	100～300ℓ /10a			収穫14日前まで									
ほうれんそう																
茶	チャノホソガ	2000～ 4000倍	200～400ℓ /10a	摘採14日前まで	2回以内		2回以内									
	チャノキイロアザ ミウマ	1000～ 4000倍														
きく	アザミウマ類	2000倍	100～300ℓ /10a	発生初期												

(令和3年3月26日現在の登録内容)

## ●効果・薬害等の注意

- 使用直前に、容器をよく振る。
- 本剤は植物体への浸透移行性がないので、かけむらのないように葉の表裏に十分散布する。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。


## ●安全使用上の注意


- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意する。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせる。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受ける。
- 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。 
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
- 施設内で使用する場合、窓等を開放し十分に換気してから施設内に立ち入る。

魚 毒 性…水産動植物(魚類)に強い影響あり。

河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意。

河川、養殖地等に飛散、流入しないよう注意(甲殻類)。

散布器具・容器の洗浄水は、河川等に流さない。 

保 管…密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な所。カギをかける。盗難・紛失の際は警察に届け出る。 

火災時の措置…火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。

漏出時の措置…漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。

輸送上の注意…移送取扱いは、ていねいに行う。

廃棄上の注意…使用量に合わせて薬液を調整し、使いきる。