

## 園芸用殺菌剤

# ホームメイト 水溶剤

炭酸水素ナトリウム…………… 80.0%  
界面活性剤、増粘剤等…………… 20.0%

農林水産省登録 第 18788 号

毒性 普通物 有効年限 4 年 包装 250g × 40 袋、500g × 20 袋

## ●特 長

1. 有効成分は炭酸水素ナトリウム(重曹)で古くから食品や医薬品等に利用されており、安全性の高い成分です。
2. JAS(日本農林規格)が定める有機農産物生産に使用することができます。

## ●適用病害および使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	炭酸水素ナトリウムを含む農薬の総使用回数
野菜類	灰色かび病	800倍	150~ 300ℓ/10a	収穫前日まで	—	散布	—
	うどんこ病	800~ 1,000倍					
	さび病	—					
ばら	灰色かび病	800倍	—	—	—	—	
	うどんこ病						
ホップ	灰色かび病	—	200~ 500ℓ/10a	—	—	—	
	うどんこ病						

(平成26年12月31日現在の登録内容)

## ●効果・薬害等の注意

- 薬剤は少量の水に溶かしてから所定量の水を加え、ゆるやかに攪拌する。
- 散布液調製後は、長時間放置せずに散布する。

- 病害の発生初期から定期的な予防的散布をする。多発生が予想される場合には効果が劣ることがあるので注意する。
- 誤って高濃度で使用すると薬害を生じるおそれがあるので、所定の希釈倍数を厳守する。
- 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節する。
- にがうりに使用する場合、品種により薬害を生じるので注意する。なお、えらぶ、か交5号、チャンピオン、久留米百成2号、吉田系の品種では薬害を生じた事例があるので使用をさける。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分に確認してから使用する。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。