

明治 マテリーナ水和剤

オキシリニック酸	10.0%
ストレプトマイシン硫酸塩	12.5%
(ストレプトマイシンとして)	10.0%
鉱物質微粉、界面活性剤等	77.5%
[ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル (PRTR・1種)]	1.5%

農林水産省登録 第17962号

毒性 普通物 有効年限 4年 包装 500g × 20袋

●特長

オキシリニック酸とストレプトマイシン、2つの有効成分の働きにより難
 防除病害といわれる軟腐病に優れた効果を示します。

●適用病害および使用方法


作物名	適用病害名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	オキシリニック酸を 含む農業の 総使用回数	ストレプトマイシンを 含む農業の 総使用回数
だいこん	軟腐病	1,000倍	100~ 300ℓ	収穫30日前まで	2回以内	散布	5回以内	2回以内
はくさい				収穫14日前まで	3回以内		3回以内	3回以内
たまねぎ				収穫7日前まで	5回以内		5回以内	5回以内
こんにゃく	腐敗病			収穫30日前まで			6回以内 (種いもへの 吹き付けは 1回以内、 植付後は 5回以内)	6回以内 (種いもへの 処理は1回以内)
ばれいしょ	軟腐病			収穫7日前まで			5回以内 (種いも浸漬は 1回以内)	5回以内 (種いもへの 処理は1回以内)
ほおずき	斑点細菌病			—	—		4回以内	4回以内

(平成26年12月31日現在の登録内容)

●効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- ボルドー液および石灰、タルク、ペントナイトなどの吸着性増量剤を含有する薬剤とは混用しない。
- はくさいに使用する場合、幼苗期、高温時には薬害(クロロシス)を生ずるおそれがあるので注意すること。
- だいこんに使用する場合、高温時には薬害(クロロシス)を生ずるおそれがあるので注意すること。
- 過度の連用をさげ、作用性の異なる薬剤と輪番使用をする(耐性菌出現回避)。
- 使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないよう注意し、特に初めて使用する場合は病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

●安全使用上の注意

- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。
- 誤飲などのないよう注意する。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせる。使用中に異常を感じた時は、直ちに医師の手当を受ける。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗する。
- 散布時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用する。散布液を吸い込んだり、浴びないように注意。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。
- 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。
- 移送取扱いは、ていねいに行う。

魚毒性等…散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

保管…密封し、直射日光をさげ、食品と区別して、冷涼・乾燥した所。
火災時の…火災時は適切な保護具を着用し、水・消火剤で消火に努める。
措置