

茶専用殺菌剤

テプロス[®] フロアブル

テブフロキン…………… 20.0%
界面活性剤、増量剤 …………… 80.0%

農林水産省登録 第 23630 号

毒性 普通物 有効年限 3年 包装 500ml × 20本

●特 長

1. 有効成分テブフロキンは既存の農薬とは異なる新規系統の化合物です。テブフロキンはミトコンドリア電子伝達系の特異的な部分に作用していると考えられており、QoI剤とも交差耐性を示さない新規作用を有します。
2. 茶の輪紋病や新梢枯死症に高い防除効果を示します。
3. 摘採3日後までの散布がおすすめです。現場では作業手順や労力の面から、すぐに散布できない場合もあります。そのような状況下でもテプロスフロアブルは、摘採3日後の散布でも一定の効果を示すことが確認されています。

●適用病害虫および使用方法


作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テブフロキンを含む農薬の総使用回数
茶	輪斑病	1000倍～2000倍	200～400ℓ/10a	摘採14日前まで	2回以内	散布	2回以内
	新梢枯死症	1000倍					

(平成31年3月1日現在の登録内容)

●使用上の注意事項

- 周辺の作物にかかると薬害を生じるおそれがあるので、かからないように十分注意して散布する。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 散布液調製後はそのまま放置せずできるだけ速やかに散布する。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないよう注意し、特に初めて使用する場合には病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

●安全使用上の注意

- 誤飲などのないよう注意する。誤って飲みこんだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせる。使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受ける。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。

保 管…密栓し、直射日光をさけ、冷涼・乾燥した場所に保管する。