

アトルバスタチン錠「Me」を服用されている方へ

血液中のコレステロールを減らすお薬です。



5mg (10錠シート)



10mg (10錠シート)

このお薬を飲むときの注意点

おうもんきんゆうかいしよ

このお薬は、ごくまれに筋肉の副作用である「**横紋筋融解症**」が起こることがあります。次のような症状がみられたら、すぐに服用を中止して医師または薬剤師にご相談ください。

- ❗ **筋肉が痛い**
- ❗ **手足に力が入らない**
- ❗ **尿の色が濃い(赤褐色になる)**



副作用はどんなお薬にもありますが、早期に発見し適切な処置をおこなえば、大事に至ることはほとんどありません。

裏面の注意事項も必ずお読みください。▶▶▶

Meファルマ株式会社

アトルバスタチン錠「Me」を服用されている方へ

血液中のコレステロールを減らすお薬です。



5mg (10錠シート)



10mg (10錠シート)

このお薬を飲むときの注意点

おうもんきんゆうかいしよ

このお薬は、ごくまれに筋肉の副作用である「**横紋筋融解症**」が起こることがあります。次のような症状がみられたら、すぐに服用を中止して医師または薬剤師にご相談ください。

- ❗ **筋肉が痛い**
- ❗ **手足に力が入らない**
- ❗ **尿の色が濃い(赤褐色になる)**



副作用はどんなお薬にもありますが、早期に発見し適切な処置をおこなえば、大事に至ることはほとんどありません。

裏面の注意事項も必ずお読みください。▶▶▶

Meファルマ株式会社

アトルバスタチン錠「Me」を服用されている方へ

血液中のコレステロールを減らすお薬です。



5mg (10錠シート)



10mg (10錠シート)

このお薬を飲むときの注意点

おうもんきんゆうかいしよ

このお薬は、ごくまれに筋肉の副作用である「**横紋筋融解症**」が起こることがあります。次のような症状がみられたら、すぐに服用を中止して医師または薬剤師にご相談ください。

- ❗ **筋肉が痛い**
- ❗ **手足に力が入らない**
- ❗ **尿の色が濃い(赤褐色になる)**



副作用はどんなお薬にもありますが、早期に発見し適切な処置をおこなえば、大事に至ることはほとんどありません。

裏面の注意事項も必ずお読みください。▶▶▶

Meファルマ株式会社

アトルバスタチン錠「Me」を服用されている方へ

血液中のコレステロールを減らすお薬です。



5mg (10錠シート)



10mg (10錠シート)

このお薬を飲むときの注意点

おうもんきんゆうかいしよ

このお薬は、ごくまれに筋肉の副作用である「**横紋筋融解症**」が起こることがあります。次のような症状がみられたら、すぐに服用を中止して医師または薬剤師にご相談ください。

- ❗ **筋肉が痛い**
- ❗ **手足に力が入らない**
- ❗ **尿の色が濃い(赤褐色になる)**



副作用はどんなお薬にもありますが、早期に発見し適切な処置をおこなえば、大事に至ることはほとんどありません。

裏面の注意事項も必ずお読みください。▶▶▶

Meファルマ株式会社

その他の注意事項

- 指示された食事療法や運動療法を必ず守ってください。
- グレープフルーツジュースによって、このお薬の作用が強くなる場合がありますので、一緒に飲むことは避けてください。
- 飲み忘れた場合は、気が付いた時、寝る前までにできるだけ早く1回分を飲んでください。
絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- 間違えて多く飲んだ場合は、医師または薬剤師にご相談ください。
- 他のお薬（抗生剤など）を飲まれるときは、医師にご相談ください。また、体調に変化を感じたときは、必ず医師にご相談ください。

おうもんきんゆうかいしょう

横紋筋融解症とは

筋肉が障害され、筋肉の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。筋肉痛や脱力などの症状があらわれます。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎不全(腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる病気)になることもあります。



ATE000202[®]
Me (GT)
改訂:2023.4

その他の注意事項

- 指示された食事療法や運動療法を必ず守ってください。
- グレープフルーツジュースによって、このお薬の作用が強くなる場合がありますので、一緒に飲むことは避けてください。
- 飲み忘れた場合は、気が付いた時、寝る前までにできるだけ早く1回分を飲んでください。
絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- 間違えて多く飲んだ場合は、医師または薬剤師にご相談ください。
- 他のお薬（抗生剤など）を飲まれるときは、医師にご相談ください。また、体調に変化を感じたときは、必ず医師にご相談ください。

おうもんきんゆうかいしょう

横紋筋融解症とは

筋肉が障害され、筋肉の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。筋肉痛や脱力などの症状があらわれます。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎不全(腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる病気)になることもあります。



ATE000202[®]
Me (GT)
改訂:2023.4

+

その他の注意事項

- 指示された食事療法や運動療法を必ず守ってください。
- グレープフルーツジュースによって、このお薬の作用が強くなる場合がありますので、一緒に飲むことは避けてください。
- 飲み忘れた場合は、気が付いた時、寝る前までにできるだけ早く1回分を飲んでください。
絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- 間違えて多く飲んだ場合は、医師または薬剤師にご相談ください。
- 他のお薬（抗生剤など）を飲まれるときは、医師にご相談ください。また、体調に変化を感じたときは、必ず医師にご相談ください。

おうもんきんゆうかいしょう

横紋筋融解症とは

筋肉が障害され、筋肉の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。筋肉痛や脱力などの症状があらわれます。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎不全(腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる病気)になることもあります。



ATE000202[®]
Me (GT)
改訂:2023.4

その他の注意事項

- 指示された食事療法や運動療法を必ず守ってください。
- グレープフルーツジュースによって、このお薬の作用が強くなる場合がありますので、一緒に飲むことは避けてください。
- 飲み忘れた場合は、気が付いた時、寝る前までにできるだけ早く1回分を飲んでください。
絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- 間違えて多く飲んだ場合は、医師または薬剤師にご相談ください。
- 他のお薬（抗生剤など）を飲まれるときは、医師にご相談ください。また、体調に変化を感じたときは、必ず医師にご相談ください。

おうもんきんゆうかいしょう

横紋筋融解症とは

筋肉が障害され、筋肉の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。筋肉痛や脱力などの症状があらわれます。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎不全(腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる病気)になることもあります。



ATE000202[®]
Me (GT)
改訂:2023.4