

プラバスタチンNa錠「Me」を服用されている方へ

血液中のコレステロールを減らすお薬です。



5mg (10錠シート)



10mg (10錠シート)

このお薬を飲むときの注意点

おうもんきんゆうかいしよ

このお薬は、ごくまれに筋肉の副作用である「**横紋筋融解症**」が起こることがあります。次のような症状がみられたら、すぐに服用を中止して医師または薬剤師にご相談ください。

- ❗ 筋肉が痛い
- ❗ 手足に力が入らない
- ❗ 尿の色が濃い(赤褐色になる)



副作用はどんなお薬にもありますが、早期に発見し適切な処置をおこなえば、大事に至ることはほとんどありません。

裏面の注意事項も必ずお読みください。▶▶▶

Meファルマ株式会社

プラバスタチンNa錠「Me」を服用されている方へ

血液中のコレステロールを減らすお薬です。



5mg (10錠シート)



10mg (10錠シート)

このお薬を飲むときの注意点

おうもんきんゆうかいしよ

このお薬は、ごくまれに筋肉の副作用である「**横紋筋融解症**」が起こることがあります。次のような症状がみられたら、すぐに服用を中止して医師または薬剤師にご相談ください。

- ❗ 筋肉が痛い
- ❗ 手足に力が入らない
- ❗ 尿の色が濃い(赤褐色になる)



副作用はどんなお薬にもありますが、早期に発見し適切な処置をおこなえば、大事に至ることはほとんどありません。

裏面の注意事項も必ずお読みください。▶▶▶

Meファルマ株式会社

プラバスタチンNa錠「Me」を服用されている方へ

血液中のコレステロールを減らすお薬です。



5mg (10錠シート)



10mg (10錠シート)

このお薬を飲むときの注意点

おうもんきんゆうかいしよ

このお薬は、ごくまれに筋肉の副作用である「**横紋筋融解症**」が起こることがあります。次のような症状がみられたら、すぐに服用を中止して医師または薬剤師にご相談ください。

- ❗ 筋肉が痛い
- ❗ 手足に力が入らない
- ❗ 尿の色が濃い(赤褐色になる)



副作用はどんなお薬にもありますが、早期に発見し適切な処置をおこなえば、大事に至ることはほとんどありません。

裏面の注意事項も必ずお読みください。▶▶▶

Meファルマ株式会社

プラバスタチンNa錠「Me」を服用されている方へ

血液中のコレステロールを減らすお薬です。



5mg (10錠シート)



10mg (10錠シート)

このお薬を飲むときの注意点

おうもんきんゆうかいしよ

このお薬は、ごくまれに筋肉の副作用である「**横紋筋融解症**」が起こることがあります。次のような症状がみられたら、すぐに服用を中止して医師または薬剤師にご相談ください。

- ❗ 筋肉が痛い
- ❗ 手足に力が入らない
- ❗ 尿の色が濃い(赤褐色になる)



副作用はどんなお薬にもありますが、早期に発見し適切な処置をおこなえば、大事に至ることはほとんどありません。

裏面の注意事項も必ずお読みください。▶▶▶

Meファルマ株式会社

その他の注意事項

- 指示された**食事療法**や**運動療法**を必ず守ってください。
- **飲み忘れた場合**は、気がついた時点で1回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は忘れた分は飲まないで、次の飲む時間に1回分を飲んでください。**絶対に2回分を一度に飲んではいけません。**
- **間違えて多く飲んだ場合**は、医師または薬剤師にご相談ください。
- **他のお薬を飲まれるときは**、医師にご相談ください。また、**体調に変化を感じたときは**、必ず医師にご相談ください。

おうもんきんゆうかいししょう

横紋筋融解症とは

筋肉が障害され、筋肉の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。筋肉痛や脱力などの症状があらわれます。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎不全(腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる病気)になることもあります。



PRE000202©
Me (GT)
改訂:2023.4

その他の注意事項

- 指示された**食事療法**や**運動療法**を必ず守ってください。
- **飲み忘れた場合**は、気がついた時点で1回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は忘れた分は飲まないで、次の飲む時間に1回分を飲んでください。**絶対に2回分を一度に飲んではいけません。**
- **間違えて多く飲んだ場合**は、医師または薬剤師にご相談ください。
- **他のお薬を飲まれるときは**、医師にご相談ください。また、**体調に変化を感じたときは**、必ず医師にご相談ください。

おうもんきんゆうかいししょう

横紋筋融解症とは

筋肉が障害され、筋肉の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。筋肉痛や脱力などの症状があらわれます。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎不全(腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる病気)になることもあります。



PRE000202©
Me (GT)
改訂:2023.4

その他の注意事項

- 指示された**食事療法**や**運動療法**を必ず守ってください。
- **飲み忘れた場合**は、気がついた時点で1回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は忘れた分は飲まないで、次の飲む時間に1回分を飲んでください。**絶対に2回分を一度に飲んではいけません。**
- **間違えて多く飲んだ場合**は、医師または薬剤師にご相談ください。
- **他のお薬を飲まれるときは**、医師にご相談ください。また、**体調に変化を感じたときは**、必ず医師にご相談ください。

おうもんきんゆうかいししょう

横紋筋融解症とは

筋肉が障害され、筋肉の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。筋肉痛や脱力などの症状があらわれます。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎不全(腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる病気)になることもあります。



PRE000202©
Me (GT)
改訂:2023.4

その他の注意事項

- 指示された**食事療法**や**運動療法**を必ず守ってください。
- **飲み忘れた場合**は、気がついた時点で1回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は忘れた分は飲まないで、次の飲む時間に1回分を飲んでください。**絶対に2回分を一度に飲んではいけません。**
- **間違えて多く飲んだ場合**は、医師または薬剤師にご相談ください。
- **他のお薬を飲まれるときは**、医師にご相談ください。また、**体調に変化を感じたときは**、必ず医師にご相談ください。

おうもんきんゆうかいししょう

横紋筋融解症とは

筋肉が障害され、筋肉の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。筋肉痛や脱力などの症状があらわれます。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎不全(腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる病気)になることもあります。



PRE000202©
Me (GT)
改訂:2023.4