

慢性疼痛で  
トアラセット® 配合錠 [Me] を  
服用されている方へ

慢性疼痛に対して使用する痛み止めのお薬です。



このお薬を飲むときの注意点

トアラセット®配合錠 [Me] は、痛みをおさえる2つの有効成分「トラマドール」と「アセトアミノフェン」が配合されています。**これらの成分が含まれている他のくすりと一緒に服用しないでください。**特にアセトアミノフェンは、解熱鎮痛薬や総合感冒薬などの市販薬にも含まれていることがありますので、十分にご注意ください。

- 通常、1回1錠、1日4回服用ですが、医師の指示通りに服用してください。
- 1回2錠、1日合計8錠を超えて服用しないでください。
- 次の服用まで4時間以上空けてください。
- 誤って多く飲んだ場合は、すぐに医師や薬剤師にご相談ください。
- **飲酒は避けてください。多量のアルコールによって副作用があらわれやすくなります。**
- **自己判断で服用を中止しないでください。**

他にも気になる事がありましたら、医師、薬剤師にご相談ください。

裏面の注意事項も必ずお読みください。▶▶▶

Meファルマ株式会社

慢性疼痛で  
トアラセット® 配合錠 [Me] を  
服用されている方へ

慢性疼痛に対して使用する痛み止めのお薬です。



このお薬を飲むときの注意点

トアラセット®配合錠 [Me] は、痛みをおさえる2つの有効成分「トラマドール」と「アセトアミノフェン」が配合されています。**これらの成分が含まれている他のくすりと一緒に服用しないでください。**特にアセトアミノフェンは、解熱鎮痛薬や総合感冒薬などの市販薬にも含まれていることがありますので、十分にご注意ください。

- 通常、1回1錠、1日4回服用ですが、医師の指示通りに服用してください。
- 1回2錠、1日合計8錠を超えて服用しないでください。
- 次の服用まで4時間以上空けてください。
- 誤って多く飲んだ場合は、すぐに医師や薬剤師にご相談ください。
- **飲酒は避けてください。多量のアルコールによって副作用があらわれやすくなります。**
- **自己判断で服用を中止しないでください。**

他にも気になる事がありましたら、医師、薬剤師にご相談ください。

裏面の注意事項も必ずお読みください。▶▶▶

Meファルマ株式会社

慢性疼痛で  
トアラセット® 配合錠 [Me] を  
服用されている方へ

慢性疼痛に対して使用する痛み止めのお薬です。



このお薬を飲むときの注意点

トアラセット®配合錠 [Me] は、痛みをおさえる2つの有効成分「トラマドール」と「アセトアミノフェン」が配合されています。**これらの成分が含まれている他のくすりと一緒に服用しないでください。**特にアセトアミノフェンは、解熱鎮痛薬や総合感冒薬などの市販薬にも含まれていることがありますので、十分にご注意ください。

- 通常、1回1錠、1日4回服用ですが、医師の指示通りに服用してください。
- 1回2錠、1日合計8錠を超えて服用しないでください。
- 次の服用まで4時間以上空けてください。
- 誤って多く飲んだ場合は、すぐに医師や薬剤師にご相談ください。
- **飲酒は避けてください。多量のアルコールによって副作用があらわれやすくなります。**
- **自己判断で服用を中止しないでください。**

他にも気になる事がありましたら、医師、薬剤師にご相談ください。

裏面の注意事項も必ずお読みください。▶▶▶

Meファルマ株式会社

慢性疼痛で  
トアラセット® 配合錠 [Me] を  
服用されている方へ

慢性疼痛に対して使用する痛み止めのお薬です。



このお薬を飲むときの注意点

トアラセット®配合錠 [Me] は、痛みをおさえる2つの有効成分「トラマドール」と「アセトアミノフェン」が配合されています。**これらの成分が含まれている他のくすりと一緒に服用しないでください。**特にアセトアミノフェンは、解熱鎮痛薬や総合感冒薬などの市販薬にも含まれていることがありますので、十分にご注意ください。

- 通常、1回1錠、1日4回服用ですが、医師の指示通りに服用してください。
- 1回2錠、1日合計8錠を超えて服用しないでください。
- 次の服用まで4時間以上空けてください。
- 誤って多く飲んだ場合は、すぐに医師や薬剤師にご相談ください。
- **飲酒は避けてください。多量のアルコールによって副作用があらわれやすくなります。**
- **自己判断で服用を中止しないでください。**

他にも気になる事がありましたら、医師、薬剤師にご相談ください。

裏面の注意事項も必ずお読みください。▶▶▶

Meファルマ株式会社

## その他の注意点

このお薬は、以下の様な副作用が出ることがあります。

### 便秘

対策として下剤と一緒に服用していただくことがあります。

### 吐き気・嘔吐

飲み始めの時期にあらわれやすいので、対策として吐き気止めと一緒に服用していただくことがあります。

症状が改善しない場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

### 眠気

飲み始めの時期にあらわれやすいので、自動車の運転や危険を伴う機械の作業などは避けてください。眠気が改善しない場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

## 保管について

- 乳幼児、子供の手の届かないところに保管してください。
- くすりが残った場合は、保管しないで、廃棄してください。
- **他の人には絶対に渡さないでください。**

### 慢性疼痛とは？

急に痛くなり比較的短い期間で治る痛みは、「急性疼痛」と呼ぶのに対し、1～3ヵ月以上続く痛みは「慢性疼痛」と呼びます。慢性疼痛の中には、原因が分からない痛みや、治りにくい痛みもあります。

痛みが長引くと日常的に行う動作がしづらくなったり、夜眠れなくなったりします。痛みを長引かせないためにも、早めに治療しましょう。



TAE000202<sup>®</sup>  
Me (AI)  
改訂:2018.11

## その他の注意点

このお薬は、以下の様な副作用が出ることがあります。

### 便秘

対策として下剤と一緒に服用していただくことがあります。

### 吐き気・嘔吐

飲み始めの時期にあらわれやすいので、対策として吐き気止めと一緒に服用していただくことがあります。

症状が改善しない場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

### 眠気

飲み始めの時期にあらわれやすいので、自動車の運転や危険を伴う機械の作業などは避けてください。眠気が改善しない場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

## 保管について

- 乳幼児、子供の手の届かないところに保管してください。
- くすりが残った場合は、保管しないで、廃棄してください。
- **他の人には絶対に渡さないでください。**

### 慢性疼痛とは？

急に痛くなり比較的短い期間で治る痛みは、「急性疼痛」と呼ぶのに対し、1～3ヵ月以上続く痛みは「慢性疼痛」と呼びます。慢性疼痛の中には、原因が分からない痛みや、治りにくい痛みもあります。

痛みが長引くと日常的に行う動作がしづらくなったり、夜眠れなくなったりします。痛みを長引かせないためにも、早めに治療しましょう。



TAE000202<sup>®</sup>  
Me (AI)  
改訂:2018.11

## その他の注意点

このお薬は、以下の様な副作用が出ることがあります。

### 便秘

対策として下剤と一緒に服用していただくことがあります。

### 吐き気・嘔吐

飲み始めの時期にあらわれやすいので、対策として吐き気止めと一緒に服用していただくことがあります。

症状が改善しない場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

### 眠気

飲み始めの時期にあらわれやすいので、自動車の運転や危険を伴う機械の作業などは避けてください。眠気が改善しない場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

## 保管について

- 乳幼児、子供の手の届かないところに保管してください。
- くすりが残った場合は、保管しないで、廃棄してください。
- **他の人には絶対に渡さないでください。**

### 慢性疼痛とは？

急に痛くなり比較的短い期間で治る痛みは、「急性疼痛」と呼ぶのに対し、1～3ヵ月以上続く痛みは「慢性疼痛」と呼びます。慢性疼痛の中には、原因が分からない痛みや、治りにくい痛みもあります。

痛みが長引くと日常的に行う動作がしづらくなったり、夜眠れなくなったりします。痛みを長引かせないためにも、早めに治療しましょう。



TAE000202<sup>®</sup>  
Me (AI)  
改訂:2018.11

## その他の注意点

このお薬は、以下の様な副作用が出ることがあります。

### 便秘

対策として下剤と一緒に服用していただくことがあります。

### 吐き気・嘔吐

飲み始めの時期にあらわれやすいので、対策として吐き気止めと一緒に服用していただくことがあります。

症状が改善しない場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

### 眠気

飲み始めの時期にあらわれやすいので、自動車の運転や危険を伴う機械の作業などは避けてください。眠気が改善しない場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

## 保管について

- 乳幼児、子供の手の届かないところに保管してください。
- くすりが残った場合は、保管しないで、廃棄してください。
- **他の人には絶対に渡さないでください。**

### 慢性疼痛とは？

急に痛くなり比較的短い期間で治る痛みは、「急性疼痛」と呼ぶのに対し、1～3ヵ月以上続く痛みは「慢性疼痛」と呼びます。慢性疼痛の中には、原因が分からない痛みや、治りにくい痛みもあります。

痛みが長引くと日常的に行う動作がしづらくなったり、夜眠れなくなったりします。痛みを長引かせないためにも、早めに治療しましょう。



TAE000202<sup>®</sup>  
Me (AI)  
改訂:2018.11