

モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「明治」
モサプリドクエン酸塩錠5mg「明治」

をお飲みになる方へ



- このお薬は、消化管の運動機能を良くするお薬です。
- 裏面に記載されている注意事項にあてはまる場合は、かかりつけの医師、薬剤師にご連絡ください。



裏面の注意事項も必ずお読みください。▶▶▶

Meファルマ株式会社

モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「明治」
モサプリドクエン酸塩錠5mg「明治」

をお飲みになる方へ



- このお薬は、消化管の運動機能を良くするお薬です。
- 裏面に記載されている注意事項にあてはまる場合は、かかりつけの医師、薬剤師にご連絡ください。



裏面の注意事項も必ずお読みください。▶▶▶

Meファルマ株式会社

モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「明治」
モサプリドクエン酸塩錠5mg「明治」

をお飲みになる方へ



- このお薬は、消化管の運動機能を良くするお薬です。
- 裏面に記載されている注意事項にあてはまる場合は、かかりつけの医師、薬剤師にご連絡ください。



裏面の注意事項も必ずお読みください。▶▶▶

Meファルマ株式会社

モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「明治」
モサプリドクエン酸塩錠5mg「明治」

をお飲みになる方へ



- このお薬は、消化管の運動機能を良くするお薬です。
- 裏面に記載されている注意事項にあてはまる場合は、かかりつけの医師、薬剤師にご連絡ください。



裏面の注意事項も必ずお読みください。▶▶▶

Meファルマ株式会社

このお薬を服用したときの注意事項

下記の場合は、かかりつけの医師、
薬剤師にご連絡ください。

- ❗ 一定期間(2週間)服用しても、胃腸の調子がよくならないとき。
- ❗ 服用してから、つぎのような症状があらわれたときは、このお薬の服用を中止してください。
(肝臓の機能が低下したときにみられる症状です。)

- ▶ 体がだるく、力が入らない
(倦怠感)



- ▶ 食欲がわかない
(食欲不振)



- ▶ 尿の色が濃くなる
(尿濃染)



- ▶ 白目が黄色くなる
(黄疸)



MOPE000602 ©
Me (Al)
改訂:2023.4

このお薬を服用したときの注意事項

下記の場合は、かかりつけの医師、
薬剤師にご連絡ください。

- ❗ 一定期間(2週間)服用しても、胃腸の調子がよくならないとき。
- ❗ 服用してから、つぎのような症状があらわれたときは、このお薬の服用を中止してください。
(肝臓の機能が低下したときにみられる症状です。)

- ▶ 体がだるく、力が入らない
(倦怠感)



- ▶ 食欲がわかない
(食欲不振)



- ▶ 尿の色が濃くなる
(尿濃染)



- ▶ 白目が黄色くなる
(黄疸)



MOPE000602 ©
Me (Al)
改訂:2023.4

このお薬を服用したときの注意事項

下記の場合は、かかりつけの医師、
薬剤師にご連絡ください。

- ❗ 一定期間(2週間)服用しても、胃腸の調子がよくならないとき。
- ❗ 服用してから、つぎのような症状があらわれたときは、このお薬の服用を中止してください。
(肝臓の機能が低下したときにみられる症状です。)

- ▶ 体がだるく、力が入らない
(倦怠感)



- ▶ 食欲がわかない
(食欲不振)



- ▶ 尿の色が濃くなる
(尿濃染)



- ▶ 白目が黄色くなる
(黄疸)



MOPE000602 ©
Me (Al)
改訂:2023.4

このお薬を服用したときの注意事項

下記の場合は、かかりつけの医師、
薬剤師にご連絡ください。

- ❗ 一定期間(2週間)服用しても、胃腸の調子がよくならないとき。
- ❗ 服用してから、つぎのような症状があらわれたときは、このお薬の服用を中止してください。
(肝臓の機能が低下したときにみられる症状です。)

- ▶ 体がだるく、力が入らない
(倦怠感)



- ▶ 食欲がわかない
(食欲不振)



- ▶ 尿の色が濃くなる
(尿濃染)



- ▶ 白目が黄色くなる
(黄疸)



MOPE000602 ©
Me (Al)
改訂:2023.4