

meiji

明治グループ

ロスバスタチンOD錠「明治」を服用されている方へ

血液中のコレステロールを減らすお薬です。



2.5mg (10錠シート)



5mg (10錠シート)

※色調は印刷の具合により、実際の色と若干異なる場合があります。

このお薬を飲むときの注意点

このお薬は、ごくまれに筋肉の副作用である「**横紋筋融解症**」が起こることがあります。次のような症状がみられたら、すぐに服用を中止して医師または薬剤師にご相談ください。

おうちんきんゆうかいしょう

- ❗ 筋肉が痛い
- ❗ 手足に力が入らない
- ❗ 尿の色が濃い(赤褐色になる)



副作用はどんなお薬にもありますが、早期に発見し適切な処置をおこなえば、大事に至ることはほとんどありません。

裏面の注意事項も必ずお読みください。▶▶▶

Meファルマ株式会社

meiji

明治グループ

ロスバスタチンOD錠「明治」を服用されている方へ

血液中のコレステロールを減らすお薬です。



2.5mg (10錠シート)



5mg (10錠シート)

※色調は印刷の具合により、実際の色と若干異なる場合があります。

このお薬を飲むときの注意点

このお薬は、ごくまれに筋肉の副作用である「**横紋筋融解症**」が起こることがあります。次のような症状がみられたら、すぐに服用を中止して医師または薬剤師にご相談ください。

おうちんきんゆうかいしょう

- ❗ 筋肉が痛い
- ❗ 手足に力が入らない
- ❗ 尿の色が濃い(赤褐色になる)



副作用はどんなお薬にもありますが、早期に発見し適切な処置をおこなえば、大事に至ることはほとんどありません。

裏面の注意事項も必ずお読みください。▶▶▶

Meファルマ株式会社

meiji

明治グループ

ロスバスタチンOD錠「明治」を服用されている方へ

血液中のコレステロールを減らすお薬です。



2.5mg (10錠シート)



5mg (10錠シート)

※色調は印刷の具合により、実際の色と若干異なる場合があります。

このお薬を飲むときの注意点

このお薬は、ごくまれに筋肉の副作用である「**横紋筋融解症**」が起こることがあります。次のような症状がみられたら、すぐに服用を中止して医師または薬剤師にご相談ください。

おうちんきんゆうかいしょう

- ❗ 筋肉が痛い
- ❗ 手足に力が入らない
- ❗ 尿の色が濃い(赤褐色になる)



副作用はどんなお薬にもありますが、早期に発見し適切な処置をおこなえば、大事に至ることはほとんどありません。

裏面の注意事項も必ずお読みください。▶▶▶

Meファルマ株式会社

meiji

明治グループ

ロスバスタチンOD錠「明治」を服用されている方へ

血液中のコレステロールを減らすお薬です。



2.5mg (10錠シート)



5mg (10錠シート)

※色調は印刷の具合により、実際の色と若干異なる場合があります。

このお薬を飲むときの注意点

このお薬は、ごくまれに筋肉の副作用である「**横紋筋融解症**」が起こることがあります。次のような症状がみられたら、すぐに服用を中止して医師または薬剤師にご相談ください。

おうちんきんゆうかいしょう

- ❗ 筋肉が痛い
- ❗ 手足に力が入らない
- ❗ 尿の色が濃い(赤褐色になる)



副作用はどんなお薬にもありますが、早期に発見し適切な処置をおこなえば、大事に至ることはほとんどありません。

裏面の注意事項も必ずお読みください。▶▶▶

Meファルマ株式会社

その他の注意事項

- 指示された食事療法や運動療法を必ず守ってください。
- 飲み忘れた場合は、気が付いた時、寝る前までにできるだけ早く1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- 間違えて多く飲んだ場合は、医師または薬剤師にご相談ください。
- 体調に変化を感じたときは、必ず医師にご相談ください。

おうもんきんゆうかいしょう 横紋筋融解症とは

筋肉が障害され、筋肉の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。筋肉痛や脱力などの症状があらわれます。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎不全(腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる病気)になることもあります。



ROE000202©
Me (AI)
改訂:2022.11

その他の注意事項

- 指示された食事療法や運動療法を必ず守ってください。
- 飲み忘れた場合は、気が付いた時、寝る前までにできるだけ早く1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- 間違えて多く飲んだ場合は、医師または薬剤師にご相談ください。
- 体調に変化を感じたときは、必ず医師にご相談ください。

おうもんきんゆうかいしょう 横紋筋融解症とは

筋肉が障害され、筋肉の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。筋肉痛や脱力などの症状があらわれます。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎不全(腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる病気)になることもあります。



ROE000202©
Me (AI)
改訂:2022.11

その他の注意事項

- 指示された食事療法や運動療法を必ず守ってください。
- 飲み忘れた場合は、気が付いた時、寝る前までにできるだけ早く1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- 間違えて多く飲んだ場合は、医師または薬剤師にご相談ください。
- 体調に変化を感じたときは、必ず医師にご相談ください。

おうもんきんゆうかいしょう 横紋筋融解症とは

筋肉が障害され、筋肉の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。筋肉痛や脱力などの症状があらわれます。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎不全(腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる病気)になることもあります。



ROE000202©
Me (AI)
改訂:2022.11

その他の注意事項

- 指示された食事療法や運動療法を必ず守ってください。
- 飲み忘れた場合は、気が付いた時、寝る前までにできるだけ早く1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- 間違えて多く飲んだ場合は、医師または薬剤師にご相談ください。
- 体調に変化を感じたときは、必ず医師にご相談ください。

おうもんきんゆうかいしょう 横紋筋融解症とは

筋肉が障害され、筋肉の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。筋肉痛や脱力などの症状があらわれます。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎不全(腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる病気)になることもあります。



ROE000202©
Me (AI)
改訂:2022.11