

健康にアイデアを

meiji

## セレコキシブ錠100mg・200mg「明治」 を服用されている方へ

セレコキシブ錠100mg・200mg「明治」は、非ステロイド性消炎・鎮痛剤（NSAID）と呼ばれるグループに属する薬です。この薬は、炎症にかかわるプロスタグランジンという物質の生成をおさえ、消炎・鎮痛効果をあらわします。

### 下記の項目にあてはまる場合は、 主治医または薬剤師にお伝えください。

- 以前にお薬を飲んで、喘息などのアレルギー症状が出たことがある。
- 胃潰瘍または十二指腸潰瘍がある。
- 肝臓、腎臓、または心臓の病気がある。
- 心臓のバイパス手術を受けたことがある。
- 妊娠または授乳中である。



※PTPシート、錠剤の色は、画面の明るさや印刷の具合により、実際の色と若干異なる場合があります。

健康にアイデアを

meiji

## セレコキシブ錠100mg・200mg「明治」 を服用されている方へ

セレコキシブ錠100mg・200mg「明治」は、非ステロイド性消炎・鎮痛剤（NSAID）と呼ばれるグループに属する薬です。この薬は、炎症にかかわるプロスタグランジンという物質の生成をおさえ、消炎・鎮痛効果をあらわします。

### 下記の項目にあてはまる場合は、 主治医または薬剤師にお伝えください。

- 以前にお薬を飲んで、喘息などのアレルギー症状が出たことがある。
- 胃潰瘍または十二指腸潰瘍がある。
- 肝臓、腎臓、または心臓の病気がある。
- 心臓のバイパス手術を受けたことがある。
- 妊娠または授乳中である。



※PTPシート、錠剤の色は、画面の明るさや印刷の具合により、実際の色と若干異なる場合があります。



健康にアイデアを

meiji

## セレコキシブ錠100mg・200mg「明治」 を服用されている方へ

セレコキシブ錠100mg・200mg「明治」は、非ステロイド性消炎・鎮痛剤（NSAID）と呼ばれるグループに属する薬です。この薬は、炎症にかかわるプロスタグランジンという物質の生成をおさえ、消炎・鎮痛効果をあらわします。

### 下記の項目にあてはまる場合は、 主治医または薬剤師にお伝えください。

- 以前にお薬を飲んで、喘息などのアレルギー症状が出たことがある。
- 胃潰瘍または十二指腸潰瘍がある。
- 肝臓、腎臓、または心臓の病気がある。
- 心臓のバイパス手術を受けたことがある。
- 妊娠または授乳中である。



※PTPシート、錠剤の色は、画面の明るさや印刷の具合により、実際の色と若干異なる場合があります。

健康にアイデアを

meiji

## セレコキシブ錠100mg・200mg「明治」 を服用されている方へ

セレコキシブ錠100mg・200mg「明治」は、非ステロイド性消炎・鎮痛剤（NSAID）と呼ばれるグループに属する薬です。この薬は、炎症にかかわるプロスタグランジンという物質の生成をおさえ、消炎・鎮痛効果をあらわします。

### 下記の項目にあてはまる場合は、 主治医または薬剤師にお伝えください。

- 以前にお薬を飲んで、喘息などのアレルギー症状が出たことがある。
- 胃潰瘍または十二指腸潰瘍がある。
- 肝臓、腎臓、または心臓の病気がある。
- 心臓のバイパス手術を受けたことがある。
- 妊娠または授乳中である。




※PTPシート、錠剤の色は、画面の明るさや印刷の具合により、実際の色と若干異なる場合があります。

## このお薬は次の目的で処方されます

- 以下の疾患並びに症状の消炎・鎮痛  
関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、  
肩関節周囲炎、頸肩腕症候群、腱・腱鞘炎
- 手術後、外傷後並びに抜歯後の消炎・鎮痛  
(手術後、外傷後並びに抜歯後の消炎・鎮痛のために服用する  
場合、初回の投与量が2回目以降と異なることに注意して  
ください)

以下のような症状があらわれることがありますので、この  
ような症状が認められたら、医師または薬剤師にご相談  
ください。



息苦しい、急激に胸を強く押さえ  
つけられた感じ、狭心痛、冷や汗

手足のまひ・しびれ、片側のまひ、  
しゃべりにくい

いつもと違う症状に気づいたり、分からないことが  
ある場合は、医師または薬剤師にご相談ください。


Meファルマ株式会社

CXE000201©  
Me (AI)  
改訂:2023.7

## このお薬は次の目的で処方されます

- 以下の疾患並びに症状の消炎・鎮痛  
関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、  
肩関節周囲炎、頸肩腕症候群、腱・腱鞘炎
- 手術後、外傷後並びに抜歯後の消炎・鎮痛  
(手術後、外傷後並びに抜歯後の消炎・鎮痛のために服用する  
場合、初回の投与量が2回目以降と異なることに注意して  
ください)

以下のような症状があらわれることがありますので、この  
ような症状が認められたら、医師または薬剤師にご相談  
ください。



息苦しい、急激に胸を強く押さえ  
つけられた感じ、狭心痛、冷や汗

手足のまひ・しびれ、片側のまひ、  
しゃべりにくい

いつもと違う症状に気づいたり、分からないことが  
ある場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

Meファルマ株式会社


CXE000201©  
Me (AI)  
改訂:2023.7



## このお薬は次の目的で処方されます

- 以下の疾患並びに症状の消炎・鎮痛  
関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、  
肩関節周囲炎、頸肩腕症候群、腱・腱鞘炎
- 手術後、外傷後並びに抜歯後の消炎・鎮痛  
(手術後、外傷後並びに抜歯後の消炎・鎮痛のために服用する  
場合、初回の投与量が2回目以降と異なることに注意して  
ください)

以下のような症状があらわれることがありますので、この  
ような症状が認められたら、医師または薬剤師にご相談  
ください。



息苦しい、急激に胸を強く押さえ  
つけられた感じ、狭心痛、冷や汗

手足のまひ・しびれ、片側のまひ、  
しゃべりにくい

いつもと違う症状に気づいたり、分からないことが  
ある場合は、医師または薬剤師にご相談ください。


Meファルマ株式会社

CXE000201©  
Me (AI)  
改訂:2023.7

## このお薬は次の目的で処方されます

- 以下の疾患並びに症状の消炎・鎮痛  
関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、  
肩関節周囲炎、頸肩腕症候群、腱・腱鞘炎
- 手術後、外傷後並びに抜歯後の消炎・鎮痛  
(手術後、外傷後並びに抜歯後の消炎・鎮痛のために服用する  
場合、初回の投与量が2回目以降と異なることに注意して  
ください)

以下のような症状があらわれることがありますので、この  
ような症状が認められたら、医師または薬剤師にご相談  
ください。



息苦しい、急激に胸を強く押さえ  
つけられた感じ、狭心痛、冷や汗

手足のまひ・しびれ、片側のまひ、  
しゃべりにくい

いつもと違う症状に気づいたり、分からないことが  
ある場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

Meファルマ株式会社

CXE000201©  
Me (AI)  
改訂:2023.7