

## デュタステリド錠 0.5mg AV「明治」 を服用されている方へ

前立腺肥大症  
のおくすりです。

1日1回 お飲みください。



分割・粉砕しないでください



- かまずにすぐに水でお飲みください(口の中を刺激する場合があります)。
- 女性や小児は、われた錠剤に触らないでください。触ってしまった場合は、すぐに石鹼と水で洗ってください。
- 肝機能障害や黄疸が現れる事があります。強い疲労感、食欲不振、白目が黄色いなど、何か異常が認められた場合には、すぐに医師等にご相談ください。
- 血清前立腺特異抗原(PSA)\*を測定する際は、医師にデュタステリド錠を服用中であることをお伝えください。
- 他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

\*血清前立腺特異抗原(PSA)とは、前立腺癌のスクリーニングにおける重要な指標です。

Meファルマ株式会社

DUE000202 ©  
Me (Al)  
改訂:2024.12

## デュタステリド錠 0.5mg AV「明治」 を服用されている方へ

前立腺肥大症  
のおくすりです。

1日1回 お飲みください。



分割・粉砕しないでください



- かまずにすぐに水でお飲みください(口の中を刺激する場合があります)。
- 女性や小児は、われた錠剤に触らないでください。触ってしまった場合は、すぐに石鹼と水で洗ってください。
- 肝機能障害や黄疸が現れる事があります。強い疲労感、食欲不振、白目が黄色いなど、何か異常が認められた場合には、すぐに医師等にご相談ください。
- 血清前立腺特異抗原(PSA)\*を測定する際は、医師にデュタステリド錠を服用中であることをお伝えください。
- 他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

\*血清前立腺特異抗原(PSA)とは、前立腺癌のスクリーニングにおける重要な指標です。

Meファルマ株式会社

DUE000202 ©  
Me (Al)  
改訂:2024.12

## デュタステリド錠 0.5mg AV「明治」 を服用されている方へ

前立腺肥大症  
のおくすりです。

1日1回 お飲みください。



分割・粉砕しないでください



- かまずにすぐに水でお飲みください(口の中を刺激する場合があります)。
- 女性や小児は、われた錠剤に触らないでください。触ってしまった場合は、すぐに石鹼と水で洗ってください。
- 肝機能障害や黄疸が現れる事があります。強い疲労感、食欲不振、白目が黄色いなど、何か異常が認められた場合には、すぐに医師等にご相談ください。
- 血清前立腺特異抗原(PSA)\*を測定する際は、医師にデュタステリド錠を服用中であることをお伝えください。
- 他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

\*血清前立腺特異抗原(PSA)とは、前立腺癌のスクリーニングにおける重要な指標です。

Meファルマ株式会社

DUE000202 ©  
Me (Al)  
改訂:2024.12

## デュタステリド錠 0.5mg AV「明治」 を服用されている方へ

前立腺肥大症  
のおくすりです。

1日1回 お飲みください。



分割・粉砕しないでください



- かまずにすぐに水でお飲みください(口の中を刺激する場合があります)。
- 女性や小児は、われた錠剤に触らないでください。触ってしまった場合は、すぐに石鹼と水で洗ってください。
- 肝機能障害や黄疸が現れる事があります。強い疲労感、食欲不振、白目が黄色いなど、何か異常が認められた場合には、すぐに医師等にご相談ください。
- 血清前立腺特異抗原(PSA)\*を測定する際は、医師にデュタステリド錠を服用中であることをお伝えください。
- 他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

\*血清前立腺特異抗原(PSA)とは、前立腺癌のスクリーニングにおける重要な指標です。

Meファルマ株式会社

DUE000202 ©  
Me (Al)  
改訂:2024.12