

# ラベプラゾールNa塩錠「明治」 を服用されている方へ

ラベプラゾール Na 塩錠「明治」は、胃粘膜の胃酸分泌機構を阻害することで胃酸分泌を抑制します。このお薬は、胃潰瘍、十二指腸潰瘍や逆流性食道炎などの治療薬です。



## お薬を飲むときの注意

- お薬はシートから出して飲んでください。
- お薬を飲むときは、コップ1杯くらいの水(またはぬるま湯)で飲んでください。  
**かんだり、砕いたりせずに、飲み込んでください。**
- お薬の飲む量・飲み方は、医師または薬剤師の指導を正しく守ってください。
- 自身の判断でお薬を中止しないでください。  
気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。

## 保管について

直射日光の当たらないところで湿気を避けて保管してください。

Meファルマ株式会社

RPE000202©  
Me  
改訂：2024.6

# ラベプラゾールNa塩錠「明治」 を服用されている方へ

ラベプラゾール Na 塩錠「明治」は、胃粘膜の胃酸分泌機構を阻害することで胃酸分泌を抑制します。このお薬は、胃潰瘍、十二指腸潰瘍や逆流性食道炎などの治療薬です。



## お薬を飲むときの注意

- お薬はシートから出して飲んでください。
- お薬を飲むときは、コップ1杯くらいの水(またはぬるま湯)で飲んでください。  
**かんだり、砕いたりせずに、飲み込んでください。**
- お薬の飲む量・飲み方は、医師または薬剤師の指導を正しく守ってください。
- 自身の判断でお薬を中止しないでください。  
気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。

## 保管について

直射日光の当たらないところで湿気を避けて保管してください。

Meファルマ株式会社

RPE000202©  
Me  
改訂：2024.6

# ラベプラゾールNa塩錠「明治」 を服用されている方へ

ラベプラゾール Na 塩錠「明治」は、胃粘膜の胃酸分泌機構を阻害することで胃酸分泌を抑制します。このお薬は、胃潰瘍、十二指腸潰瘍や逆流性食道炎などの治療薬です。



## お薬を飲むときの注意

- お薬はシートから出して飲んでください。
- お薬を飲むときは、コップ1杯くらいの水(またはぬるま湯)で飲んでください。  
**かんだり、砕いたりせずに、飲み込んでください。**
- お薬の飲む量・飲み方は、医師または薬剤師の指導を正しく守ってください。
- 自身の判断でお薬を中止しないでください。  
気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。

## 保管について

直射日光の当たらないところで湿気を避けて保管してください。

Meファルマ株式会社

RPE000202©  
Me  
改訂：2024.6

# ラベプラゾールNa塩錠「明治」 を服用されている方へ

ラベプラゾール Na 塩錠「明治」は、胃粘膜の胃酸分泌機構を阻害することで胃酸分泌を抑制します。このお薬は、胃潰瘍、十二指腸潰瘍や逆流性食道炎などの治療薬です。



## お薬を飲むときの注意

- お薬はシートから出して飲んでください。
- お薬を飲むときは、コップ1杯くらいの水(またはぬるま湯)で飲んでください。  
**かんだり、砕いたりせずに、飲み込んでください。**
- お薬の飲む量・飲み方は、医師または薬剤師の指導を正しく守ってください。
- 自身の判断でお薬を中止しないでください。  
気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。

## 保管について

直射日光の当たらないところで湿気を避けて保管してください。

Meファルマ株式会社

RPE000202©  
Me  
改訂：2024.6