モンテルカスト細粒4mg「明治」の飲ませ方

●バナナ風味でほのかな甘さのある細粒剤です。
●1日1回1包、夜寝る前に飲ませてください。

飲ませ方の例

●本剤をスプーンに盛り、お口に直接入れて飲ませます。
●ふくろから直接、飲ませます。

注意
●開封後直ちに（15分以内）全量を飲ませてください。飲み残した場合は保存せず廃棄してください。
●服用後、水などの飲み物を飲ませることもできます。
●医師の指示なしに自分の判断でお薬を飲ませるのをやめないでください。

Meファルマ株式会社　MKPE000201Ⓢ　Me（GT）　改訂：2023.8

モンテルカスト細粒4mg「明治」の飲ませ方

●バナナ風味でほのかな甘さのある細粒剤です。
●1日1回1包、夜寝る前に飲ませてください。

飲ませ方の例

●本剤をスプーンに盛り、お口に直接入れて飲ませます。
●ふくろから直接、飲ませます。

注意
●開封後直ちに（15分以内）全量を飲ませてください。飲み残した場合は保存せず廃棄してください。
●服用後、水などの飲み物を飲ませることもできます。
●医師の指示なしに自分の判断でお薬を飲ませるのをやめないでください。

Meファルマ株式会社　MKPE000201Ⓢ　Me（GT）　改訂：2023.8

モンテルカスト細粒4mg「明治」の飲ませ方

●バナナ風味でほのかな甘さのある細粒剤です。
●1日1回1包、夜寝る前に飲ませてください。

飲ませ方の例

●本剤をスプーンに盛り、お口に直接入れて飲ませます。
●ふくろから直接、飲ませます。

注意
●開封後直ちに（15分以内）全量を飲ませてください。飲み残した場合は保存せず廃棄してください。
●服用後、水などの飲み物を飲ませることもできます。
●医師の指示なしに自分の判断でお薬を飲ませるのをやめないでください。

Meファルマ株式会社　MKPE000201Ⓢ　Me（GT）　改訂：2023.8

モンテルカスト細粒4mg「明治」の飲ませ方

●バナナ風味でほのかな甘さのある細粒剤です。
●1日1回1包、夜寝る前に飲ませてください。

飲ませ方の例

●本剤をスプーンに盛り、お口に直接入れて飲ませます。
●ふくろから直接、飲ませます。

注意
●開封後直ちに（15分以内）全量を飲ませてください。飲み残した場合は保存せず廃棄してください。
●服用後、水などの飲み物を飲ませることもできます。
●医師の指示なしに自分の判断でお薬を飲ませるのをやめないでください。

Meファルマ株式会社　MKPE000201Ⓢ　Me（GT）　改訂：2023.8

モンテルカスト細粒4mg「明治」の飲ませ方

●バナナ風味でほのかな甘さのある細粒剤です。
●1日1回1包、夜寝る前に飲ませてください。

飲ませ方の例

●本剤をスプーンに盛り、お口に直接入れて飲ませます。
●ふくろから直接、飲ませます。

注意
●開封後直ちに（15分以内）全量を飲ませてください。飲み残した場合は保存せず廃棄してください。
●服用後、水などの飲み物を飲ませることもできます。
●医師の指示なしに自分の判断でお薬を飲ませるのをやめないでください。

Meファルマ株式会社　MKPE000201Ⓢ　Me（GT）　改訂：2023.8

モンテルカスト細粒4mg「明治」の飲ませ方

●バナナ風味でほのかな甘さのある細粒剤です。
●1日1回1包、夜寝る前に飲ませてください。

飲ませ方の例

●本剤をスプーンに盛り、お口に直接入れて飲ませます。
●ふくろから直接、飲ませます。

注意
●開封後直ちに（15分以内）全量を飲ませてください。飲み残した場合は保存せず廃棄してください。
●服用後、水などの飲み物を飲ませることもできます。
●医師の指示なしに自分の判断でお薬を飲ませるのをやめないでください。

Meファルマ株式会社　MKPE000201Ⓢ　Me（GT）　改訂：2023.8

モンテルカスト細粒4mg「明治」の飲ませ方

●バナナ風味でほのかな甘さのある細粒剤です。
●1日1回1包、夜寝る前に飲ませてください。

飲ませ方の例

●本剤をスプーンに盛り、お口に直接入れて飲ませます。
●ふくろから直接、飲ませます。

注意
●開封後直ちに（15分以内）全量を飲ませてください。飲み残した場合は保存せず廃棄してください。
●服用後、水などの飲み物を飲ませることもできます。
●医師の指示なしに自分の判断でお薬を飲ませるのをやめないでください。

Meファルマ株式会社　MKPE000201Ⓢ　Me（GT）　改訂：2023.8

モンテルカスト細粒4mg「明治」の飲ませ方

●バナナ風味でほのかな甘さのある細粒剤です。
●1日1回1包、夜寝る前に飲ませてください。

飲ませ方の例

●本剤をスプーンに盛り、お口に直接入れて飲ませます。
●ふくろから直接、飲ませます。

注意
●開封後直ちに（15分以内）全量を飲ませてください。飲み残した場合は保存せず廃棄してください。
●服用後、水などの飲み物を飲ませることもできます。
●医師の指示なしに自分の判断でお薬を飲ませるのをやめないでください。

Meファルマ株式会社　MKPE000201Ⓢ　Me（GT）　改訂：2023.8

モンテルカスト細粒4mg「明治」の飲ませ方

●バナナ風味でほのかな甘さのある細粒剤です。
●1日1回1包、夜寝る前に飲ませてください。

飲ませ方の例

●本剤をスプーンに盛り、お口に直接入れて飲ませます。
●ふくろから直接、飲ませます。

注意
●開封後直ちに（15分以内）全量を飲ませてください。飲み残した場合は保存せず廃棄してください。
●服用後、水などの飲み物を飲ませることもできます。
●医師の指示なしに自分の判断でお薬を飲ませるのをやめないでください。

Meファルマ株式会社　MKPE000201Ⓢ　Me（GT）　改訂：2023.8

モンテルカスト細粒4mg「明治」の飲ませ方

●バナナ風味でほのかな甘さのある細粒剤です。
●1日1回1包、夜寝る前に飲ませてください。

飲ませ方の例

●本剤をスプーンに盛り、お口に直接入れて飲ませます。
●ふくろから直接、飲ませます。

注意
●開封後直ちに（15分以内）全量を飲ませてください。飲み残した場合は保存せず廃棄してください。
●服用後、水などの飲み物を飲ませることもできます。
●医師の指示なしに自分の判断でお薬を飲ませるのをやめないでください。

Meファルマ株式会社　MKPE000201Ⓢ　Me（GT）　改訂：2023.8

モンテルカスト細粒4mg「明治」の飲ませ方

●バナナ風味でほのかな甘さのある細粒剤です。
●1日1回1包、夜寝る前に飲ませてください。

飲ませ方の例

●本剤をスプーンに盛り、お口に直接入れて飲ませます。
●ふくろから直接、飲ませます。

注意
●開封後直ちに（15分以内）全量を飲ませてください。飲み残した場合は保存せず廃棄してください。
●服用後、水などの飲み物を飲ませることもできます。
●医師の指示なしに自分の判断でお薬を飲ませるのをやめないでください。

Meファルマ株式会社　MKPE000201Ⓢ　Me（GT）　改訂：2023.8

モンテルカスト細粒4mg「明治」の飲ませ方

●バナナ風味でほのかな甘さのある細粒剤です。
●1日1回1包、夜寝る前に飲ませてください。

飲ませ方の例

●本剤をスプーンに盛り、お口に直接入れて飲ませます。
●ふくろから直接、飲ませます。

注意
●開封後直ちに（15分以内）全量を飲ませてください。飲み残した場合は保存せず廃棄してください。
●服用後、水などの飲み物を飲ませることもできます。
●医師の指示なしに自分の判断でお薬を飲ませるのをやめないでください。

Meファルマ株式会社　MKPE000201Ⓢ　Me（GT）　改訂：2023.8