

モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」 の飲み方



- チェリー風味でほのかな甘さのあるお薬です。
- アメをなめるように口の中でとがすか、かみくだいて飲んでください。
(とがす、またはかみくだいた後に水で飲むこともできます)
- 1日1回1錠、夜、寝る前に飲んでください。

注意 喘息の症状が改善しているときでも、医師の指示なしに自分の判断でお薬を飲むのをやめないでください。

Meファルマ株式会社 MKCE000201® Me(GT) 改訂:2023.11

モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」 の飲み方



- チェリー風味でほのかな甘さのあるお薬です。
- アメをなめるように口の中でとがすか、かみくだいて飲んでください。
(とがす、またはかみくだいた後に水で飲むこともできます)
- 1日1回1錠、夜、寝る前に飲んでください。

注意 喘息の症状が改善しているときでも、医師の指示なしに自分の判断でお薬を飲むのをやめないでください。

Meファルマ株式会社 MKCE000201® Me(GT) 改訂:2023.11

モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」 の飲み方



- チェリー風味でほのかな甘さのあるお薬です。
- アメをなめるように口の中でとがすか、かみくだいて飲んでください。
(とがす、またはかみくだいた後に水で飲むこともできます)
- 1日1回1錠、夜、寝る前に飲んでください。

注意 喘息の症状が改善しているときでも、医師の指示なしに自分の判断でお薬を飲むのをやめないでください。

Meファルマ株式会社 MKCE000201® Me(GT) 改訂:2023.11

モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」 の飲み方



- チェリー風味でほのかな甘さのあるお薬です。
- アメをなめるように口の中でとがすか、かみくだいて飲んでください。
(とがす、またはかみくだいた後に水で飲むこともできます)
- 1日1回1錠、夜、寝る前に飲んでください。

注意 喘息の症状が改善しているときでも、医師の指示なしに自分の判断でお薬を飲むのをやめないでください。

Meファルマ株式会社 MKCE000201® Me(GT) 改訂:2023.11

モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」 の飲み方



- チェリー風味でほのかな甘さのあるお薬です。
- アメをなめるように口の中でとがすか、かみくだいて飲んでください。
(とがす、またはかみくだいた後に水で飲むこともできます)
- 1日1回1錠、夜、寝る前に飲んでください。

注意 喘息の症状が改善しているときでも、医師の指示なしに自分の判断でお薬を飲むのをやめないでください。

Meファルマ株式会社 MKCE000201® Me(GT) 改訂:2023.11

モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」 の飲み方



- チェリー風味でほのかな甘さのあるお薬です。
- アメをなめるように口の中でとがすか、かみくだいて飲んでください。
(とがす、またはかみくだいた後に水で飲むこともできます)
- 1日1回1錠、夜、寝る前に飲んでください。

注意 喘息の症状が改善しているときでも、医師の指示なしに自分の判断でお薬を飲むのをやめないでください。

Meファルマ株式会社 MKCE000201® Me(GT) 改訂:2023.11

モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」 の飲み方



- チェリー風味でほのかな甘さのあるお薬です。
- アメをなめるように口の中でとがすか、かみくだいて飲んでください。
(とがす、またはかみくだいた後に水で飲むこともできます)
- 1日1回1錠、夜、寝る前に飲んでください。

注意 喘息の症状が改善しているときでも、医師の指示なしに自分の判断でお薬を飲むのをやめないでください。

Meファルマ株式会社 MKCE000201® Me(GT) 改訂:2023.11

モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」 の飲み方



- チェリー風味でほのかな甘さのあるお薬です。
- アメをなめるように口の中でとがすか、かみくだいて飲んでください。
(とがす、またはかみくだいた後に水で飲むこともできます)
- 1日1回1錠、夜、寝る前に飲んでください。

注意 喘息の症状が改善しているときでも、医師の指示なしに自分の判断でお薬を飲むのをやめないでください。

Meファルマ株式会社 MKCE000201® Me(GT) 改訂:2023.11