

タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」
(α1ブロッカー)
を服用する患者さんへ

前立腺肥大症に伴う
排尿障害
を改善するお薬です



0.1mg



0.2mg (実物大)

1日1回食後に
お飲みください

OD錠の飲み方・ご注意

- 1 噛み砕かずにお飲みください。
- 2 だ液のみで飲むことができます。お薬を舌の上に乗せ、だ液を含ませて舌で軽くつぶしてから、だ液と一緒に飲み込んでください。
- 3 寝たままの状態では、水なしでは飲まないでください。
- 4 立ちくらみ、めまい等があらわれた場合は、医師・薬剤師にご相談ください。

白内障の手術を受ける際のご注意

このお薬を服用していることを、眼科の先生にお伝えください。

Meファルマ株式会社

TME000201®
Me(GT)
改訂：2023.11

タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」
(α1ブロッカー)
を服用する患者さんへ

前立腺肥大症に伴う
排尿障害
を改善するお薬です



0.1mg



0.2mg (実物大)

1日1回食後に
お飲みください

OD錠の飲み方・ご注意

- 1 噛み砕かずにお飲みください。
- 2 だ液のみで飲むことができます。お薬を舌の上に乗せ、だ液を含ませて舌で軽くつぶしてから、だ液と一緒に飲み込んでください。
- 3 寝たままの状態では、水なしでは飲まないでください。
- 4 立ちくらみ、めまい等があらわれた場合は、医師・薬剤師にご相談ください。

白内障の手術を受ける際のご注意

このお薬を服用していることを、眼科の先生にお伝えください。

Meファルマ株式会社

TME000201®
Me(GT)
改訂：2023.11

タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」
(α1ブロッカー)
を服用する患者さんへ

前立腺肥大症に伴う
排尿障害
を改善するお薬です



0.1mg



0.2mg (実物大)

1日1回食後に
お飲みください

OD錠の飲み方・ご注意

- 1 噛み砕かずにお飲みください。
- 2 だ液のみで飲むことができます。お薬を舌の上に乗せ、だ液を含ませて舌で軽くつぶしてから、だ液と一緒に飲み込んでください。
- 3 寝たままの状態では、水なしでは飲まないでください。
- 4 立ちくらみ、めまい等があらわれた場合は、医師・薬剤師にご相談ください。

白内障の手術を受ける際のご注意

このお薬を服用していることを、眼科の先生にお伝えください。

Meファルマ株式会社

TME000201®
Me(GT)
改訂：2023.11

タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」
(α1ブロッカー)
を服用する患者さんへ

前立腺肥大症に伴う
排尿障害
を改善するお薬です



0.1mg



0.2mg (実物大)

1日1回食後に
お飲みください

OD錠の飲み方・ご注意

- 1 噛み砕かずにお飲みください。
- 2 だ液のみで飲むことができます。お薬を舌の上に乗せ、だ液を含ませて舌で軽くつぶしてから、だ液と一緒に飲み込んでください。
- 3 寝たままの状態では、水なしでは飲まないでください。
- 4 立ちくらみ、めまい等があらわれた場合は、医師・薬剤師にご相談ください。

白内障の手術を受ける際のご注意

このお薬を服用していることを、眼科の先生にお伝えください。

Meファルマ株式会社

TME000201®
Me(GT)
改訂：2023.11