

大切な注意事項が記載されています。
必ずお読みください。

クロピドグレル錠「明治」を服用される患者さんへ

このお薬は血栓（血のかたまり）ができて、
血管が詰まるのを抑えるお薬です。



(実物大)

服用の際の注意点

(医師・薬剤師からの指示どおりに、お薬を服用してください。)

- **1日1回服用してください。**
- 飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く1回分だけを飲んでください。次の服用時間が近い場合には1回分をとばし、次からまた時間どおり飲んでください。**絶対に2回分を一度に飲まないでください。**
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。
- 誤って他の人が服用することがないように厳重に保管してください。また、飲み残したお薬はすべて廃棄してください。
- 歯の治療、手術や内視鏡検査などを予定している方はお薬を服用する前に医師または薬剤師に相談してください。

裏面も必ずお読みください。▶

大切な注意事項が記載されています。
必ずお読みください。

クロピドグレル錠「明治」を服用される患者さんへ

このお薬は血栓（血のかたまり）ができて、
血管が詰まるのを抑えるお薬です。



(実物大)

服用の際の注意点

(医師・薬剤師からの指示どおりに、お薬を服用してください。)

- **1日1回服用してください。**
- 飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く1回分だけを飲んでください。次の服用時間が近い場合には1回分をとばし、次からまた時間どおり飲んでください。**絶対に2回分を一度に飲まないでください。**
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。
- 誤って他の人が服用することがないように厳重に保管してください。また、飲み残したお薬はすべて廃棄してください。
- 歯の治療、手術や内視鏡検査などを予定している方はお薬を服用する前に医師または薬剤師に相談してください。

裏面も必ずお読みください。▶

このお薬を服用して、下記のような症状に気がつきましたら、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

- ひどい頭痛がする
- 気分が悪い、嘔吐した
- うとうとする、意識がもうろうとする
- 便が黒っぽい・血が混じる
- 鼻・歯ぐきから出血した
- 皮膚にあざ・斑点ができた
- 皮膚にぶつぶつができた
- 尿が茶色っぽい
- 皮膚・白眼が黄色い
- 強い疲労感、食欲がない
- かぜのような症状がある（発熱、寒気、のどが痛む）

上記のほかにも、普段とは異なる症状に気づきましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

その他の注意事項

ほかの病院・診療科を受診する場合は、このお薬を服用していることを医師・薬剤師にお伝えください。

連絡先：

このお薬を服用して、下記のような症状に気がつきましたら、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

- ひどい頭痛がする
- 気分が悪い、嘔吐した
- うとうとする、意識がもうろうとする
- 便が黒っぽい・血が混じる
- 鼻・歯ぐきから出血した
- 皮膚にあざ・斑点ができた
- 皮膚にぶつぶつができた
- 尿が茶色っぽい
- 皮膚・白眼が黄色い
- 強い疲労感、食欲がない
- かぜのような症状がある（発熱、寒気、のどが痛む）

上記のほかにも、普段とは異なる症状に気づきましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

その他の注意事項

ほかの病院・診療科を受診する場合は、このお薬を服用していることを医師・薬剤師にお伝えください。

連絡先：