

プレガバリンOD錠「明治」 を服用されている 患者さんとそのご家族へ



「痛み」には炎症による痛みと、神経が圧迫されたり、障害されることによっておこる痛みがあります。(心理・社会的な痛みもあります)

炎症による痛み

重なっている
痛みもあります

神経の圧迫・障害
による痛み

プレガバリンOD錠「明治」は、**神経の圧迫・障害による痛み**に対して処方され、神経伝達物質の放出を抑制し、鎮痛作用を発揮します。

このお薬は、飲み始めてから、徐々に用量を増やしていき、一定期間継続して服用することで効果を発揮します。ご自分の判断で服用を中止したり、服用量や服用回数を変更せず、気になることがある場合は、必ず医師にご相談ください。

プレガバリンOD錠「明治」



プレガバリンOD錠「明治」は、唾液のみ(水なし)で口の中で溶けるお薬です。唾液や水またはぬるま湯で飲み込んでください(口の中では吸収されません)。

※錠剤の色は、画面の明るさや印刷の具合により、実際の色と若干異なる場合があります。

プレガバリンOD錠「明治」 を服用されている 患者さんとそのご家族へ



「痛み」には炎症による痛みと、神経が圧迫されたり、障害されることによっておこる痛みがあります。(心理・社会的な痛みもあります)

炎症による痛み

重なっている
痛みもあります

神経の圧迫・障害
による痛み

プレガバリンOD錠「明治」は、**神経の圧迫・障害による痛み**に対して処方され、神経伝達物質の放出を抑制し、鎮痛作用を発揮します。

このお薬は、飲み始めてから、徐々に用量を増やしていき、一定期間継続して服用することで効果を発揮します。ご自分の判断で服用を中止したり、服用量や服用回数を変更せず、気になることがある場合は、必ず医師にご相談ください。

プレガバリンOD錠「明治」



プレガバリンOD錠「明治」は、唾液のみ(水なし)で口の中で溶けるお薬です。唾液や水またはぬるま湯で飲み込んでください(口の中では吸収されません)。

※錠剤の色は、画面の明るさや印刷の具合により、実際の色と若干異なる場合があります。

このお薬は、めまい、ぼんやりする、意識消失などの症状があらわれることがあります

自動車などの運転や危険を伴う機械の操作などをしないでください。高齢の方は、転倒の危険もありますので、十分に注意してください。



このお薬は、めまい、ぼんやりする、意識消失などの症状があらわれることがあります

自動車などの運転や危険を伴う機械の操作などをしないでください。高齢の方は、転倒の危険もありますので、十分に注意してください。



体重が増えることがあります

体重が増えることがありますので、気になる徴候があらわれた場合には、ご相談ください。



体重が増えることがあります

体重が増えることがありますので、気になる徴候があらわれた場合には、ご相談ください。



服用を急に中止しないでください

服用を急に中止すると、眠れなくなる・吐き気がする・頭痛・下痢などがあらわれることがあります。



服用を急に中止しないでください

服用を急に中止すると、眠れなくなる・吐き気がする・頭痛・下痢などがあらわれることがあります。



次の方は必ずご相談ください

- 腎臓が悪い方
- 透析を受けている方
- 心臓が悪い方
- 妊娠中または授乳中の方
- 血管浮腫の既往歴がある方



次の方は必ずご相談ください

- 腎臓が悪い方
- 透析を受けている方
- 心臓が悪い方
- 妊娠中または授乳中の方
- 血管浮腫の既往歴がある方



ほかの医療機関を受診する場合

ほかの医療機関を受診する場合や、他にお薬を服用している場合は必ずお伝えください。



ほかの医療機関を受診する場合

ほかの医療機関を受診する場合や、他にお薬を服用している場合は必ずお伝えください。



飲酒について

アルコールはこのお薬の作用に影響しますので、控えてください。



飲酒について

アルコールはこのお薬の作用に影響しますので、控えてください。



気になる症状がある場合、わからないことがある場合は医師または薬剤師にご相談ください。

医療機関名:

気になる症状がある場合、わからないことがある場合は医師または薬剤師にご相談ください。

医療機関名: