


デュタステリド錠0.5mgZA「明治」の作用について

デュタステリド錠0.5mgZA「明治」は、テストステロンをDHT*に変換する5 α 還元酵素（I型及びII型）を阻害し²⁾、ヘアサイクルを正常に近づけることで発毛を促します。

*DHT; ジヒドロテストステロン: 男性型脱毛症に関与する男性ホルモンのひとつ。毛髪の成長期を短くするため、毛髪が十分成長できなくなり、細く短くなっていく。

2) Miteva M, et al.: Expert Opin Pharmacother, 13: 1271-1281 (2012)

ヘアサイクルとデュタステリド錠0.5mgZA「明治」のはたらき



Meファルマ株式会社

DUZE000302 ©
Me(AI)
改訂: 2024.12

健康にアイデアを
meiji

デュタステリド錠0.5mgZA「明治」を服用される方へ

監修: 杏林大学医学部皮膚科学教室 教授 大山 学 先生

男性型脱毛症について

- 男性型脱毛症は、AGA (Androgenetic alopeciaの略) とも言われ、男性の薄毛の主な原因と考えられています。
- このお薬による治療の主な目的は、脱毛症の進行の防止ですが、**髪の毛が太くなる、髪の毛が増える**といった効果も期待できます¹⁾。

1) Gubelin Harcha W, et al.: J Am Acad Dermatol, 70: 489-498 (2014)

服用を続けることが大切です

このお薬は、服用を始めてから3ヵ月程度で症状の改善を自覚する人もいますが、通常6ヵ月間、服用を続けて効果判定する必要があります。



ご自身の判断で、お薬の服用をやめたりせず、医師の指示通りに服用を継続しましょう。

※錠剤およびPTPシートの色は印刷の具合により、実際の色と若干異なる場合があります。

服用にあたって気を付けていただきたいこと

- **医師の指示通りに服用してください。**
1日1回1錠を服用してください。
このお薬の効きめは、食事の影響を受けないので、いつでも服用することができます。
- **錠剤は、かんだり、なめたりせずに服用してください。**
口の中を刺激する場合があります。
- **女性や子どもは服用しないでください。**
また、**粉砕・破損した薬剤に触れないでください。**
妊娠している女性が服用した場合、男子胎児の生殖器官等の発達に影響を及ぼすおそれがあります。
また、このお薬の有効成分は、触れると皮膚から吸収されます。粉砕・破損した薬剤に触れてしまった場合は、すぐに石けんと水で洗い流してください。
- **PSA (血清前立腺特異抗原) を測定する際は、医師にデュタステリド錠「明治」を服用中であることをお伝えください。**
このお薬は前立腺腫瘍のマーカーであるPSAの数値を低下させますが、その影響を医師が考慮すれば、お薬を服用中でもPSA検査を受けることができます。
- **男性における男性型脱毛症以外の脱毛症の治療を目的として服用することはできません。**

起こりうる副作用について

このお薬を服用中に、以下のような症状があらわれた場合は、医師または薬剤師にすぐに相談してください。

- 特にご注意いただきたい重大な副作用として、肝機能障害や黄疸があらわれることがあります。からだがだるい、吐き気、食欲不振、白目や皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなるなどの症状があらわれたら、ただちに医師又は薬剤師の先生にご相談ください。
- その他の副作用として、性機能不全(リビドー減退、勃起不全、射精障害)などがあらわれることがあります。

- 男性の生殖能力への影響は明らかではありませんが、精子の数や精液量が減少したり、精子の運動が弱まるおそれがあります。
- このお薬との関連性は明らかではありませんが、前立腺肥大症患者を対象とした海外臨床試験において、乳がんが報告されています。