

大切な注意事項が記載されています。  
必ずお読みください。

## ロレアス<sup>®</sup> 配合錠「SANIK」を服用される方へ

ロレアス<sup>®</sup> 配合錠は、「クロピドグレル」と「アスピリン」の2つの成分をまとめて1つの錠剤にしたお薬です。

血液のかたまり(血栓<sup>けっせん</sup>)をできにくくすることで、血管がつまるのを防ぐ働きがあります。

先発医薬品と原薬、添加物および製法などが同一のオーソライズド・ジェネリック医薬品\*です。

\*先発医薬品メーカーの許諾を受けたジェネリック医薬品



大切な注意事項が記載されています。  
必ずお読みください。

## ロレアス<sup>®</sup> 配合錠「SANIK」を服用される方へ

ロレアス<sup>®</sup> 配合錠は、「クロピドグレル」と「アスピリン」の2つの成分をまとめて1つの錠剤にしたお薬です。

血液のかたまり(血栓<sup>けっせん</sup>)をできにくくすることで、血管がつまるのを防ぐ働きがあります。

先発医薬品と原薬、添加物および製法などが同一のオーソライズド・ジェネリック医薬品\*です。

\*先発医薬品メーカーの許諾を受けたジェネリック医薬品



医師・薬剤師の指示に従い、薬の飲み方を守ってください。

### 飲み方について

- 1日1回服用してください。
- 空腹時をさけて服用してください。
- 錠剤は割ったりせず、そのままかまずに服用してください。
- 飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く1回分だけを飲んでください。次の服用時間が近い場合には1回分をとばし、次からまた時間どおり飲んでください。絶対に2回分を一度に飲まないでください。

### 服用中の注意点

- 次の場合には、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。
  - ・ 歯の治療、手術や内視鏡検査などを受ける場合 (血が止まりにくくなる場合があります)
  - ・ 他の病院を受診する場合や、薬局で他のお薬を購入する場合 (一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります)



裏面も必ずお読みください。▶


医師・薬剤師の指示に従い、薬の飲み方を守ってください。

### 飲み方について

- 1日1回服用してください。
- 空腹時をさけて服用してください。
- 錠剤は割ったりせず、そのままかまずに服用してください。
- 飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く1回分だけを飲んでください。次の服用時間が近い場合には1回分をとばし、次からまた時間どおり飲んでください。絶対に2回分を一度に飲まないでください。

### 服用中の注意点

- 次の場合には、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。
  - ・ 歯の治療、手術や内視鏡検査などを受ける場合 (血が止まりにくくなる場合があります)
  - ・ 他の病院を受診する場合や、薬局で他のお薬を購入する場合 (一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります)



裏面も必ずお読みください。▶

## 副作用について

次の症状に気づいたら、**すぐに医師または薬剤師に連絡してください。**

体がだるい  
食欲不振



発熱や悪寒、  
のどの痛み、  
息苦しい



うとうとしたり、  
意識がうすれる



突然の  
頭痛・めまい



鼻血、歯ぐき  
からの出血




皮膚や白目が  
黄色くなる



目の充血や  
ただれ



吐き気、嘔吐  
腹痛、下痢



くちびるや口の  
中がただれる



皮膚にあざ、  
斑点ができる



かゆみ、発疹



便が黒っぽい、  
血が混じる



尿の色が  
濃くなる



この他にも気になる症状が  
あらわれた場合や、わからない  
ことがある場合には、  
**医師または薬剤師に相談して  
ください。**



## 保管等に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かない所に保管してください。
- 飲み残したお薬はすべて廃棄してください。

Meファルマ株式会社

LA000201©  
Me (AI)  
作成:2026.4

## 副作用について

次の症状に気づいたら、**すぐに医師または薬剤師に連絡してください。**

体がだるい  
食欲不振



発熱や悪寒、  
のどの痛み、  
息苦しい



うとうとしたり、  
意識がうすれる



突然の  
頭痛・めまい




鼻血、歯ぐき  
からの出血



皮膚や白目が  
黄色くなる



目の充血や  
ただれ



吐き気、嘔吐  
腹痛、下痢



くちびるや口の  
中がただれる



皮膚にあざ、  
斑点ができる



かゆみ、発疹



便が黒っぽい、  
血が混じる



尿の色が  
濃くなる



この他にも気になる症状が  
あらわれた場合や、わからない  
ことがある場合には、  
**医師または薬剤師に相談して  
ください。**



## 保管等に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かない所に保管してください。
- 飲み残したお薬はすべて廃棄してください。

Meファルマ株式会社

LA000201©  
Me (AI)  
作成:2026.4