

## 【概要】

テルミサルタン錠 40mg「明治」とミカルデイス<sup>®</sup>錠 40mg をクロスオーバー法によりそれぞれ 1 錠（テルミサルタンとして 40mg）、健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC、C<sub>max</sub>）について 90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $\log(0.80) \sim \log(1.25)$  の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。

## 【試験方法】

### 1. 投与薬剤

試験製剤：テルミサルタン錠 40mg「明治」

標準製剤：ミカルデイス<sup>®</sup>錠 40mg

### 2. 採血ポイント


投与前、投与後 0.25、0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、8、12、24、48、72 時間後（計 15 ポイント）

### 3. 被験者

日本人健康成人男子 18 例

## 【試験結果】

### 1. 血漿中濃度推移



40mg 錠投与時の血漿中テルミサルタン濃度推移

# テルミサルタン錠 40mg「明治」の生物学的同等性に関する資料

## 2. 薬物動態パラメータ

薬 剤 名	AUC <sub>t</sub> (ng·hr/mL)	C <sub>max</sub> (ng/mL)	T <sub>max</sub> (hr)	T <sub>1/2</sub> (hr)	k <sub>el</sub> (hr <sup>-1</sup> )
テルミサルタン錠 40mg「明治」	1292±500	181.3±77.3	1.3±0.5	21.0±5.9	0.0355 ±0.0099
ミカルディス®錠 40mg	1301±433	182.3±98.5	1.2±0.6	20.8±5.8	0.0356 ±0.0088

(Mean±S.D., n=18)

血漿中濃度並びに AUC、C<sub>max</sub> 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

## 3. 生物学的同等性の判定

判定パラメータ	製剤間の判定パラメータの対数値の 平均値の差の 90%信頼区間	判定基準	判定
AUC <sub>t</sub>	log(0.9070)~log(1.0417)	log(0.80)~ log(1.25)	同等
C <sub>max</sub>	log(0.8898)~log(1.1972)		

### 【準拠したガイドライン】

- ・「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」  
薬食審査発 0229 号 第 10 号（平成 24 年 2 月 29 日一部改正）