

【概要】

クロピドグレル錠 75mg「明治」の溶出性を、日本薬局方医薬品各条に定められた「クロピドグレル硫酸塩錠」の溶出性の項に従い評価した。その結果、45分間の溶出率は 84.8~100.6%であり、溶出規格に適合していることが確認された。

【試験方法】

試験方法：日本薬局方 一般試験法 溶出試験法 パドル法

試験液量：900mL

温度：37±0.5℃

試験液：水

回転数：毎分 50 回転

測定回数：3回

溶出規格：45分間の溶出率は80%以上である。

【試験結果】

45 分間の溶出率は 84.8~100.6%であり、日本薬局方「クロピドグレル硫酸塩錠」の溶出規格に適合した。

表 クロピドグレル錠 75mg「明治」の日本薬局方溶出規格への適合性 (n=18)

ロット番号	溶出率(%) (n=6、測定回数3回)	判定
CG3T01	87.1~100.5	適合
CG3T02	87.6~99.5	適合
CG3T03	84.8~100.6	適合

製造販売元

高田製薬株式会社

販売元

Meファルマ株式会社

<製品情報問い合わせ先>

Meiji Seika ファルマ株式会社 くすり相談室

(Me ファルマ株式会社専用ダイヤル)

電話(0120)261-158 FAX(03)3272-2438