



アリピプラゾール「明治」を服用される患者さんご家族の方へ

アリピプラゾール「明治」を服用する際は以下のような副作用があらわれることがあります。このような症状が認められた場合には、医師または薬剤師に相談してください。

1. 高血糖や低血糖があらわれることがあります。

高血糖の症状（激しいのどの渇き、水やジュースをたくさん飲む、尿の量が多い、尿の回数が多いなど）や低血糖の症状（脱力感、倦怠感、冷汗、手足のふるえ、うとうとする、意識が薄れるなど）があらわれたら、ただちに受診してください。

2. 衝動が抑えられない状態があらわれることがあります。

社会的に不利な結果を招くにもかかわらず、ギャンブルや過剰で無計画な買い物を繰り返したり、性欲や食欲が病的に亢進するなど、衝動が抑えられない状態があらわれることがあります。このような症状があらわれたら、医師または薬剤師に相談してください。



ご家族の方へ

患者さんの症状や行動が変化する可能性について十分に理解できるまで説明を受け、患者さんの状態の変化について観察し、変化がみられた場合には、医師または薬剤師に連絡してください。また、患者さんご自身も病状に変化があったと感じた場合には、ご家族の方にも伝えるようにしてください。



- 医師の指示通りに服用してください。
- 気になる症状や分からないことがある場合には医師または薬剤師に相談してください。