

注意！

！ お薬は、ご家族、介護者が管理してください。

！ お薬を飲み忘れても、2日分を一度に飲ませないで下さい。過量に飲んでしまった場合は、直ぐに病院へ連絡してください。

！ お薬の服用をあなたの判断で中止しないでください。

！ いつもと違う症状や状態が持続した場合は、主治医または薬剤師にご相談ください。



Meiji Seika ファルマ株式会社

DN001104®
(GT)
改訂：2020.1

ドネペジル塩酸塩錠「明治」 ドネペジル塩酸塩OD錠「明治」

をお飲みになる患者さんの

ご家族 **介護者**の方へ


主治医の指示に従って、
決められた量を
服用させてください。



監修：
獨協医科大学 副学長 脳神経内科

平田 幸一 先生

meiji



お薬の飲み方

5 mg錠（白色の錠剤）を
1日1回服用します。

症状によっては、お薬の量が
増えることがあります。

3 mg錠 と **3 mg錠**
（黄色の錠剤） （黄色の錠剤）

3 mg錠 と **5 mg錠**
（黄色の錠剤） （白色の錠剤）

5 mg錠 と **5 mg錠**
（白色の錠剤） （白色の錠剤）

10 mg錠
（ピンクの錠剤）



お薬の量が増えた時は、特に吐き気や食欲不振といった
症状がみられることがあります。

OD錠
に関する
注意事項

OD錠は、少量の水でも崩壊しやすいよう
改良された製剤です（唾液でも溶けます）。
長い時間口の中に含んでいると、
しびれを感じる場合があります。

お薬を飲んでいる時に、
以下のような症状が出る場合があります。

吐き気や食欲不振



便がやわらかくなる



活発になりすぎる



落ち着きがなくなる



いつもと違う症状や状態が持続した場合は、
主治医にご相談ください。