

ミルタザピン錠「明治」をお飲みになる 患者様とご家族へ

うつ病治療の基本は、「十分な休養」と「薬の服用」です。
うつ病は、良くなったり、悪くなったりを繰り返しながら、徐々に良くなっていく病気ですので、焦らずにじっくりと治療を受けましょう。
また、治療にはご家族や周りの方のサポートもかせません。もし、病状に変化があったと感じた場合には、ご家族にも相談をしましょう。

服用前に確認して下さい

- この薬と一緒に飲んではいけない薬や、一緒に飲むときには医師の指導が必要な薬があります。
現在、他の薬を飲んでいる方は必ず主治医にお申し出下さい。

この薬の飲み方について

- コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んで下さい。
- この薬は少なめの量から始め、徐々に治療に適切な量まで増やしていきます。
飲み始めの時期に、眠気や倦怠感が見られる場合があります。服薬の継続でおさまる場合もありますが、我慢できない時は、主治医にお申し出下さい。
- 急に飲む量を減らしたり、使用を中止したりすると、「不安になる」、「興奮しやすい」、「ふらつき」、「頭痛」、「吐き気」などの症状があらわれることがあります。ご自身の判断で飲むのをやめないで下さい。

Meiji Seika ファルマ株式会社

ミルタザピン錠「明治」をお飲みになる 患者様とご家族へ

うつ病治療の基本は、「十分な休養」と「薬の服用」です。
うつ病は、良くなったり、悪くなったりを繰り返しながら、徐々に良くなっていく病気ですので、焦らずにじっくりと治療を受けましょう。
また、治療にはご家族や周りの方のサポートもかせません。もし、病状に変化があったと感じた場合には、ご家族にも相談をしましょう。

服用前に確認して下さい

- この薬と一緒に飲んではいけない薬や、一緒に飲むときには医師の指導が必要な薬があります。
現在、他の薬を飲んでいる方は必ず主治医にお申し出下さい。

この薬の飲み方について

- コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んで下さい。
- この薬は少なめの量から始め、徐々に治療に適切な量まで増やしていきます。
飲み始めの時期に、眠気や倦怠感が見られる場合があります。服薬の継続でおさまる場合もありますが、我慢できない時は、主治医にお申し出下さい。
- 急に飲む量を減らしたり、使用を中止したりすると、「不安になる」、「興奮しやすい」、「ふらつき」、「頭痛」、「吐き気」などの症状があらわれることがあります。ご自身の判断で飲むのをやめないで下さい。

Meiji Seika ファルマ株式会社

ミルタザピン錠「明治」をお飲みになる 患者様とご家族へ

うつ病治療の基本は、「十分な休養」と「薬の服用」です。
うつ病は、良くなったり、悪くなったりを繰り返しながら、徐々に良くなっていく病気ですので、焦らずにじっくりと治療を受けましょう。
また、治療にはご家族や周りの方のサポートもかせません。もし、病状に変化があったと感じた場合には、ご家族にも相談をしましょう。

服用前に確認して下さい

- この薬と一緒に飲んではいけない薬や、一緒に飲むときには医師の指導が必要な薬があります。
現在、他の薬を飲んでいる方は必ず主治医にお申し出下さい。

この薬の飲み方について

- コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んで下さい。
- この薬は少なめの量から始め、徐々に治療に適切な量まで増やしていきます。
飲み始めの時期に、眠気や倦怠感が見られる場合があります。服薬の継続でおさまる場合もありますが、我慢できない時は、主治医にお申し出下さい。
- 急に飲む量を減らしたり、使用を中止したりすると、「不安になる」、「興奮しやすい」、「ふらつき」、「頭痛」、「吐き気」などの症状があらわれることがあります。ご自身の判断で飲むのをやめないで下さい。

Meiji Seika ファルマ株式会社

ミルタザピン錠「明治」をお飲みになる 患者様とご家族へ

うつ病治療の基本は、「十分な休養」と「薬の服用」です。
うつ病は、良くなったり、悪くなったりを繰り返しながら、徐々に良くなっていく病気ですので、焦らずにじっくりと治療を受けましょう。
また、治療にはご家族や周りの方のサポートもかせません。もし、病状に変化があったと感じた場合には、ご家族にも相談をしましょう。

服用前に確認して下さい

- この薬と一緒に飲んではいけない薬や、一緒に飲むときには医師の指導が必要な薬があります。
現在、他の薬を飲んでいる方は必ず主治医にお申し出下さい。

この薬の飲み方について

- コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んで下さい。
- この薬は少なめの量から始め、徐々に治療に適切な量まで増やしていきます。
飲み始めの時期に、眠気や倦怠感が見られる場合があります。服薬の継続でおさまる場合もありますが、我慢できない時は、主治医にお申し出下さい。
- 急に飲む量を減らしたり、使用を中止したりすると、「不安になる」、「興奮しやすい」、「ふらつき」、「頭痛」、「吐き気」などの症状があらわれることがあります。ご自身の判断で飲むのをやめないで下さい。

Meiji Seika ファルマ株式会社

以下の症状があらわれた時は主治医に相談して下さい

- 飲み始めの時期や飲む量を変更した時に、不安感が強くなり、「死にたい」と思うなど、うつ病の症状が悪化することがあります。
- この薬との関連性は明らかではありませんが、「不安になる」、「いらいらする」、「あせる」、「興奮しやすい」、「発作的にパニック状態になる」、「ちょっとした刺激でも気持ちや体調が変化する」、「敵意を持つ」、「攻撃的になる」、「衝動的に行動する」、「じっとしていることができない」などの症状があらわれることがあります。

ご家族の方へ

- うつ病への理解を深め、温かく見守ることが回復へのサポートとなります。少しでも気になる症状や行動の変化がみられた場合には、主治医に連絡をして下さい。
- 「死にたいという気持ちになる」、「興奮しやすい」、「攻撃的になる」、「ちょっとした刺激でも気持ちや体調が変化する」など、行動の変化や症状の悪化について、主治医から十分に説明を受けて下さい。

その他

- 眠気が起きることがあります。車の運転、高所の作業、危険をともなう機械の操作などはいししないで下さい。
- 妊娠または妊娠している可能性がある方は主治医に相談して下さい。
- 7～17歳の大うつ病性障害のある人がこの薬を飲んだ場合、有効性が確認できなかったという報告があります。
18歳未満の方は、主治医と十分に相談して下さい。

- 主治医の指示通りに服用して下さい。
- 気になる症状や分からないことがある場合は主治医にご相談下さい。

MRT001303 (A1)
改訂:2022.3

以下の症状があらわれた時は主治医に相談して下さい

- 飲み始めの時期や飲む量を変更した時に、不安感が強くなり、「死にたい」と思うなど、うつ病の症状が悪化することがあります。
- この薬との関連性は明らかではありませんが、「不安になる」、「いらいらする」、「あせる」、「興奮しやすい」、「発作的にパニック状態になる」、「ちょっとした刺激でも気持ちや体調が変化する」、「敵意を持つ」、「攻撃的になる」、「衝動的に行動する」、「じっとしていることができない」などの症状があらわれることがあります。

ご家族の方へ

- うつ病への理解を深め、温かく見守ることが回復へのサポートとなります。少しでも気になる症状や行動の変化がみられた場合には、主治医に連絡をして下さい。
- 「死にたいという気持ちになる」、「興奮しやすい」、「攻撃的になる」、「ちょっとした刺激でも気持ちや体調が変化する」など、行動の変化や症状の悪化について、主治医から十分に説明を受けて下さい。

その他

- 眠気が起きることがあります。車の運転、高所の作業、危険をともなう機械の操作などはいししないで下さい。
- 妊娠または妊娠している可能性がある方は主治医に相談して下さい。
- 7～17歳の大うつ病性障害のある人がこの薬を飲んだ場合、有効性が確認できなかったという報告があります。
18歳未満の方は、主治医と十分に相談して下さい。

- 主治医の指示通りに服用して下さい。
- 気になる症状や分からないことがある場合は主治医にご相談下さい。

MRT001303 (A1)
改訂:2022.3

以下の症状があらわれた時は主治医に相談して下さい

- 飲み始めの時期や飲む量を変更した時に、不安感が強くなり、「死にたい」と思うなど、うつ病の症状が悪化することがあります。
- この薬との関連性は明らかではありませんが、「不安になる」、「いらいらする」、「あせる」、「興奮しやすい」、「発作的にパニック状態になる」、「ちょっとした刺激でも気持ちや体調が変化する」、「敵意を持つ」、「攻撃的になる」、「衝動的に行動する」、「じっとしていることができない」などの症状があらわれることがあります。

ご家族の方へ

- うつ病への理解を深め、温かく見守ることが回復へのサポートとなります。少しでも気になる症状や行動の変化がみられた場合には、主治医に連絡をして下さい。
- 「死にたいという気持ちになる」、「興奮しやすい」、「攻撃的になる」、「ちょっとした刺激でも気持ちや体調が変化する」など、行動の変化や症状の悪化について、主治医から十分に説明を受けて下さい。

その他

- 眠気が起きることがあります。車の運転、高所の作業、危険をともなう機械の操作などはいししないで下さい。
- 妊娠または妊娠している可能性がある方は主治医に相談して下さい。
- 7～17歳の大うつ病性障害のある人がこの薬を飲んだ場合、有効性が確認できなかったという報告があります。
18歳未満の方は、主治医と十分に相談して下さい。

- 主治医の指示通りに服用して下さい。
- 気になる症状や分からないことがある場合は主治医にご相談下さい。

MRT001303 (A1)
改訂:2022.3

以下の症状があらわれた時は主治医に相談して下さい

- 飲み始めの時期や飲む量を変更した時に、不安感が強くなり、「死にたい」と思うなど、うつ病の症状が悪化することがあります。
- この薬との関連性は明らかではありませんが、「不安になる」、「いらいらする」、「あせる」、「興奮しやすい」、「発作的にパニック状態になる」、「ちょっとした刺激でも気持ちや体調が変化する」、「敵意を持つ」、「攻撃的になる」、「衝動的に行動する」、「じっとしていることができない」などの症状があらわれることがあります。

ご家族の方へ

- うつ病への理解を深め、温かく見守ることが回復へのサポートとなります。少しでも気になる症状や行動の変化がみられた場合には、主治医に連絡をして下さい。
- 「死にたいという気持ちになる」、「興奮しやすい」、「攻撃的になる」、「ちょっとした刺激でも気持ちや体調が変化する」など、行動の変化や症状の悪化について、主治医から十分に説明を受けて下さい。

その他

- 眠気が起きることがあります。車の運転、高所の作業、危険をともなう機械の操作などはいししないで下さい。
- 妊娠または妊娠している可能性がある方は主治医に相談して下さい。
- 7～17歳の大うつ病性障害のある人がこの薬を飲んだ場合、有効性が確認できなかったという報告があります。
18歳未満の方は、主治医と十分に相談して下さい。

- 主治医の指示通りに服用して下さい。
- 気になる症状や分からないことがある場合は主治医にご相談下さい。

MRT001303 (A1)
改訂:2022.3