

クエチアピン「明治」を 服用されている方へ

監修 医療法人聖美会 多摩中央病院 理事長 大久保 善朗 先生



- 主治医の指示どおりに服用してください。
- 気になる症状や、分からないことがある場合は主治医にご相談ください。

- 血糖値を上昇させることがあるため、糖尿病の方は服用できません
- 高血糖や肥満、ご家族が糖尿病の場合は糖尿病になりやすい方ですので医師にご相談ください

クエチアピン「明治」を 服用されている方へ

監修 医療法人聖美会 多摩中央病院 理事長 大久保 善朗 先生



- 主治医の指示どおりに服用してください。
- 気になる症状や、分からないことがある場合は主治医にご相談ください。

- 血糖値を上昇させることがあるため、糖尿病の方は服用できません
- 高血糖や肥満、ご家族が糖尿病の場合は糖尿病になりやすい方ですので医師にご相談ください

クエチアピン「明治」を 服用されている方へ

監修 医療法人聖美会 多摩中央病院 理事長 大久保 善朗 先生



- 主治医の指示どおりに服用してください。
- 気になる症状や、分からないことがある場合は主治医にご相談ください。

- 血糖値を上昇させることがあるため、糖尿病の方は服用できません
- 高血糖や肥満、ご家族が糖尿病の場合は糖尿病になりやすい方ですので医師にご相談ください

クエチアピン「明治」を 服用されている方へ

監修 医療法人聖美会 多摩中央病院 理事長 大久保 善朗 先生



- 主治医の指示どおりに服用してください。
- 気になる症状や、分からないことがある場合は主治医にご相談ください。

- 血糖値を上昇させることがあるため、糖尿病の方は服用できません
- 高血糖や肥満、ご家族が糖尿病の場合は糖尿病になりやすい方ですので医師にご相談ください

このお薬を飲むときの注意

●いま飲んでいるお薬を必ず医師・薬剤師に伝えてください
一緒に飲んではいけないお薬や、飲み合わせによっては好ましくない作用が出る場合があります。

●自動車などの機械の運転を避けてください
運転等に影響する場合があります。

●飲酒は控えてください
アルコールはこのお薬の作用を強める働きがあります。

●ご自身の判断でお薬の量を調節しないでください
治療に必要な量のお薬が処方されていますので主治医の指示通りに服用してください。

●飲み忘れに気づいたらすぐに1回分を飲んでください
まとめて2回分を飲まないでください。誤って一度に多く飲んだ時はすぐに医師・薬剤師に連絡してください。

こんな症状がみられたら

いつもと違うと感じたり、気になる症状がある場合は
早めに医師・薬剤師に相談してください

- | | |
|---------------|-----------------|
| ●高血糖・のどの渇き・多飲 | ●おなかが張る・便秘 |
| ●発汗・発熱 | ●短期間での体重増加 |
| ●立ちくらみ | ●舌や顔の筋肉がひとりでに動く |
| ●手足の震え・こわばり | ●皮膚や白目が黄色くなる |
| ●睡眠障害(不眠・眠気) | ●動悸・胸の痛み・脈がとぶ |

Meiji Seika ファルマ株式会社

QE000509◎
(AI)
改訂:2023.11

このお薬を飲むときの注意

●いま飲んでいるお薬を必ず医師・薬剤師に伝えてください
一緒に飲んではいけないお薬や、飲み合わせによっては好ましくない作用が出る場合があります。

●自動車などの機械の運転を避けてください
運転等に影響する場合があります。

●飲酒は控えてください
アルコールはこのお薬の作用を強める働きがあります。

●ご自身の判断でお薬の量を調節しないでください
治療に必要な量のお薬が処方されていますので主治医の指示通りに服用してください。

●飲み忘れに気づいたらすぐに1回分を飲んでください
まとめて2回分を飲まないでください。誤って一度に多く飲んだ時はすぐに医師・薬剤師に連絡してください。

こんな症状がみられたら

いつもと違うと感じたり、気になる症状がある場合は
早めに医師・薬剤師に相談してください

- | | |
|---------------|-----------------|
| ●高血糖・のどの渇き・多飲 | ●おなかが張る・便秘 |
| ●発汗・発熱 | ●短期間での体重増加 |
| ●立ちくらみ | ●舌や顔の筋肉がひとりでに動く |
| ●手足の震え・こわばり | ●皮膚や白目が黄色くなる |
| ●睡眠障害(不眠・眠気) | ●動悸・胸の痛み・脈がとぶ |

Meiji Seika ファルマ株式会社

QE000509◎
(AI)
改訂:2023.11

このお薬を飲むときの注意

●いま飲んでいるお薬を必ず医師・薬剤師に伝えてください
一緒に飲んではいけないお薬や、飲み合わせによっては好ましくない作用が出る場合があります。

●自動車などの機械の運転を避けてください
運転等に影響する場合があります。

●飲酒は控えてください
アルコールはこのお薬の作用を強める働きがあります。

●ご自身の判断でお薬の量を調節しないでください
治療に必要な量のお薬が処方されていますので主治医の指示通りに服用してください。

●飲み忘れに気づいたらすぐに1回分を飲んでください
まとめて2回分を飲まないでください。誤って一度に多く飲んだ時はすぐに医師・薬剤師に連絡してください。

こんな症状がみられたら

いつもと違うと感じたり、気になる症状がある場合は
早めに医師・薬剤師に相談してください

- | | |
|---------------|-----------------|
| ●高血糖・のどの渇き・多飲 | ●おなかが張る・便秘 |
| ●発汗・発熱 | ●短期間での体重増加 |
| ●立ちくらみ | ●舌や顔の筋肉がひとりでに動く |
| ●手足の震え・こわばり | ●皮膚や白目が黄色くなる |
| ●睡眠障害(不眠・眠気) | ●動悸・胸の痛み・脈がとぶ |

Meiji Seika ファルマ株式会社

QE000509◎
(AI)
改訂:2023.11

このお薬を飲むときの注意

●いま飲んでいるお薬を必ず医師・薬剤師に伝えてください
一緒に飲んではいけないお薬や、飲み合わせによっては好ましくない作用が出る場合があります。

●自動車などの機械の運転を避けてください
運転等に影響する場合があります。

●飲酒は控えてください
アルコールはこのお薬の作用を強める働きがあります。

●ご自身の判断でお薬の量を調節しないでください
治療に必要な量のお薬が処方されていますので主治医の指示通りに服用してください。

●飲み忘れに気づいたらすぐに1回分を飲んでください
まとめて2回分を飲まないでください。誤って一度に多く飲んだ時はすぐに医師・薬剤師に連絡してください。

こんな症状がみられたら

いつもと違うと感じたり、気になる症状がある場合は
早めに医師・薬剤師に相談してください

- | | |
|---------------|-----------------|
| ●高血糖・のどの渇き・多飲 | ●おなかが張る・便秘 |
| ●発汗・発熱 | ●短期間での体重増加 |
| ●立ちくらみ | ●舌や顔の筋肉がひとりでに動く |
| ●手足の震え・こわばり | ●皮膚や白目が黄色くなる |
| ●睡眠障害(不眠・眠気) | ●動悸・胸の痛み・脈がとぶ |

Meiji Seika ファルマ株式会社

QE000509◎
(AI)
改訂:2023.11