

骨ページェット病の患者さんへ

リセドロン酸Na錠17.5mg「明治」の飲み方

毎日1回1錠8週間



朝起きた空腹時に

コップ1杯の水

またはぬるま湯で



飲んでから**30分間**

横にならない、食事をしない、
他のお薬も飲まない



朝起きた 空腹時に

朝起きて胃が空っぽのときに飲みましょう。
胃の中に食べ物があると、お薬の吸収が悪くなる
ことがあります。

コップ1杯の 水または ぬるま湯で

コップ1杯(約180cc)の水またはぬるま湯で確実に飲みましょう。お薬が食道にとどまると粘膜に刺激を与える可能性があります。また、水以外で飲むとお薬の吸収が悪くなります。

※ミネラルウォーターで飲むときは、硬度の高いものはさけてください。

飲んでから 30分間 横にならない 食事をしない 他のお薬も飲まない

飲んでから30分は横にならないでください。
横になるとお薬が食道にとどまったり逆流して粘膜に刺激を与えたりすることがあります。
また30分以内には水以外のものは飲まないでください。お薬の吸収が悪くなります。

下記の様な症状が出た場合は、すみやかに医師、薬剤師にご相談ください。

- 食べ物が飲み込みにくい、飲み込むときにのどが痛い、胸に痛みを感じる など
- 体がだるい、力が入らない、食欲不振、発熱、皮膚や白目が黄色くなる など
- あごの痛みやしびれ・だるさ、歯ぐきのはれ、歯のぐらつき など
- 耳のかゆみ・違和感、耳だれ、耳の痛み、太ももの痛み など

お薬を飲み忘れたとき・・・

食べ物、飲み物を口にしたら場合、
他のお薬を飲んだ場合

食後時間が経っても、吸収が悪いので、

翌日の朝に1錠飲んでください。

食べ物、飲み物を口にしていない場合、
他のお薬を飲んでいない場合

すぐにお飲みください。

飲んだ後は、30分間は横にならず、水以外の
飲食もさけてください。

※ご不明な点、疑問点は医師または薬剤師におたずねください。

医療機関名