トスフロキサシントシル酸塩 小児用細粒15%「明治」の飲ませ方

甘く飲みやすい、イチゴ風味のお薬です。
そのまま水で飲ませるか、水に混ぜて飲ませてください。

どうしても水で飲めないお子様には
●水のかわりに、次のようなものと混ぜると飲ませやすくなります。＊アレルギーをお持ちの際はご注意ください。

ジャム　ピーナッツバター

小さなお子様には
●1～2滴の水と混ぜペースト状にして、ほほの内側や上あごに塗って飲ませます。

このお薬は、先発品（オゼックス®細粒小児用15%）と原薬、添加物、製造方法が同一の**オーソライズド・ジェネリック**です。

Meiji Seika ファルマ株式会社　TS000901Ⓢ（GT）作成：2021.12

トスフロキサシントシル酸塩 小児用細粒15%「明治」の飲ませ方
甘く飲みやすい、イチゴ風味のお薬です。
そのまま水で飲ませるか、水に混ぜて飲ませてください。
どうしても水で飲めないお子様には
●水のかわりに、次のようなものと混ぜると飲ませやすくなります。＊アレルギーをお持ちの際はご注意ください。
ジャム　ピーナッツバター
小さなお子様には
●1～2滴の水と混ぜペースト状にして、ほほの内側や上あごに塗って飲ませます。
このお薬は、先発品（オゼックス®細粒小児用15%）と原薬、添加物、製造方法が同一のオーソライズド・ジェネリックです。
Meiji Seika ファルマ株式会社　TS000901Ⓢ（GT）作成：2021.12

トスフロキサシントシル酸塩 小児用細粒15%「明治」の飲ませ方
甘く飲みやすい、イチゴ風味のお薬です。
そのまま水で飲ませるか、水に混ぜて飲ませてください。
どうしても水で飲めないお子様には
●水のかわりに、次のようなものと混ぜると飲ませやすくなります。＊アレルギーをお持ちの際はご注意ください。
ジャム　ピーナッツバター
小さなお子様には
●1～2滴の水と混ぜペースト状にして、ほほの内側や上あごに塗って飲ませます。
このお薬は、先発品（オゼックス®細粒小児用15%）と原薬、添加物、製造方法が同一のオーソライズド・ジェネリックです。
Meiji Seika ファルマ株式会社　TS000901Ⓢ（GT）作成：2021.12

トスフロキサシントシル酸塩 小児用細粒15%「明治」の飲ませ方
甘く飲みやすい、イチゴ風味のお薬です。
そのまま水で飲ませるか、水に混ぜて飲ませてください。
どうしても水で飲めないお子様には
●水のかわりに、次のようなものと混ぜると飲ませやすくなります。＊アレルギーをお持ちの際はご注意ください。
ジャム　ピーナッツバター
小さなお子様には
●1～2滴の水と混ぜペースト状にして、ほほの内側や上あごに塗って飲ませます。
このお薬は、先発品（オゼックス®細粒小児用15%）と原薬、添加物、製造方法が同一のオーソライズド・ジェネリックです。
Meiji Seika ファルマ株式会社　TS000901Ⓢ（GT）作成：2021.12

トスフロキサシントシル酸塩 小児用細粒15%「明治」の飲ませ方
甘く飲みやすい、イチゴ風味のお薬です。
そのまま水で飲ませるか、水に混ぜて飲ませてください。
どうしても水で飲めないお子様には
●水のかわりに、次のようなものと混ぜると飲ませやすくなります。＊アレルギーをお持ちの際はご注意ください。
ジャム　ピーナッツバター
小さなお子様には
●1～2滴の水と混ぜペースト状にして、ほほの内側や上あごに塗って飲ませます。
このお薬は、先発品（オゼックス®細粒小児用15%）と原薬、添加物、製造方法が同一のオーソライズド・ジェネリックです。
Meiji Seika ファルマ株式会社　TS000901Ⓢ（GT）作成：2021.12

トスフロキサシントシル酸塩 小児用細粒15%「明治」の飲ませ方
甘く飲みやすい、イチゴ風味のお薬です。
そのまま水で飲ませるか、水に混ぜて飲ませてください。
どうしても水で飲めないお子様には
●水のかわりに、次のようなものと混ぜると飲ませやすくなります。＊アレルギーをお持ちの際はご注意ください。
ジャム　ピーナッツバター
小さなお子様には
●1～2滴の水と混ぜペースト状にして、ほほの内側や上あごに塗って飲ませます。
このお薬は、先発品（オゼックス®細粒小児用15%）と原薬、添加物、製造方法が同一のオーソライズド・ジェネリックです。
Meiji Seika ファルマ株式会社　TS000901Ⓢ（GT）作成：2021.12

トスフロキサシントシル酸塩 小児用細粒15%「明治」の飲ませ方
甘く飲みやすい、イチゴ風味のお薬です。
そのまま水で飲ませるか、水に混ぜて飲ませてください。
どうしても水で飲めないお子様には
●水のかわりに、次のようなものと混ぜると飲ませやすくなります。＊アレルギーをお持ちの際はご注意ください。
ジャム　ピーナッツバター
小さなお子様には
●1～2滴の水と混ぜペースト状にして、ほほの内側や上あごに塗って飲ませます。
このお薬は、先発品（オゼックス®細粒小児用15%）と原薬、添加物、製造方法が同一のオーソライズド・ジェネリックです。
Meiji Seika ファルマ株式会社　TS000901Ⓢ（GT）作成：2021.12

トスフロキサシントシル酸塩 小児用細粒15%「明治」の飲ませ方
甘く飲みやすい、イチゴ風味のお薬です。
そのまま水で飲ませるか、水に混ぜて飲ませてください。
どうしても水で飲めないお子様には
●水のかわりに、次のようなものと混ぜると飲ませやすくなります。＊アレルギーをお持ちの際はご注意ください。
ジャム　ピーナッツバター
小さなお子様には
●1～2滴の水と混ぜペースト状にして、ほほの内側や上あごに塗って飲ませます。
このお薬は、先発品（オゼックス®細粒小児用15%）と原薬、添加物、製造方法が同一のオーソライズド・ジェネリックです。
Meiji Seika ファルマ株式会社　TS000901Ⓢ（GT）作成：2021.12

トスフロキサシントシル酸塩 小児用細粒15%「明治」の飲ませ方
甘く飲みやすい、イチゴ風味のお薬です。
そのまま水で飲ませるか、水に混ぜて飲ませてください。
どうしても水で飲めないお子様には
●水のかわりに、次のようなものと混ぜると飲ませやすくなります。＊アレルギーをお持ちの際はご注意ください。
ジャム　ピーナッツバター
小さなお子様には
●1～2滴の水と混ぜペースト状にして、ほほの内側や上あごに塗って飲ませます。
このお薬は、先発品（オゼックス®細粒小児用15%）と原薬、添加物、製造方法が同一のオーソライズド・ジェネリックです。
Meiji Seika ファルマ株式会社　TS000901Ⓢ（GT）作成：2021.12