

オランザピン錠・OD錠・細粒「明治」 を服用されている患者様とご家族の方へ

このお薬は、強い不安感やイライラをしずめ、気分を安定させる作用があります。



オランザピン細粒1%「明治」



このお薬を安全に
お使いいただくために、
**裏面の注意事項を
必ずお読みください。**

(錠剤はすべて実物大)

オランザピン錠・OD錠・細粒「明治」 を服用されている患者様とご家族の方へ

このお薬は、強い不安感やイライラをしずめ、気分を安定させる作用があります。



オランザピン細粒1%「明治」



このお薬を安全に
お使いいただくために、
**裏面の注意事項を
必ずお読みください。**

(錠剤はすべて実物大)

オランザピン錠・OD錠・細粒「明治」 を服用されている患者様とご家族の方へ

このお薬は、強い不安感やイライラをしずめ、気分を安定させる作用があります。



オランザピン細粒1%「明治」



このお薬を安全に
お使いいただくために、
**裏面の注意事項を
必ずお読みください。**

(錠剤はすべて実物大)

オランザピン錠・OD錠・細粒「明治」 を服用されている患者様とご家族の方へ

このお薬は、強い不安感やイライラをしずめ、気分を安定させる作用があります。



オランザピン細粒1%「明治」



このお薬を安全に
お使いいただくために、
**裏面の注意事項を
必ずお読みください。**

(錠剤はすべて実物大)

このお薬を服用する前にご確認ください

- このお薬を服用している間、体重が増えたり、血糖値が上昇したりする場合があります。
- そのため、糖尿病の方や糖尿病と診断された経験のある方は、このお薬を服用できません。
- また、次のような方は糖尿病になりやすい方ですので、必ず服用前に主治医または薬剤師にご相談ください。
 - ご家族に糖尿病の方がいる
 - 肥満の傾向がある
 - 血糖値が高いといわれたことがある
 - 体重が増加傾向にある

次のような症状があらわれたら主治医にご相談ください

血糖値が高くなると、以下のような症状があらわれることがあります。

激しくのどが渇き、
大量の水分をとる

おしっこに行く
回数が増える、
おしっこの量が多くなる



急に体重が
減ってくる

- 上記のような症状があらわれても放置しておくと、急に倒れてしまうことがあるので注意が必要です。
- その他、気になる症状がある場合は、主治医または薬剤師にご相談ください。



Meiji Seika ファルマ株式会社

ZY000603©
(A)
改訂:2021.5

このお薬を服用する前にご確認ください


- このお薬を服用している間、体重が増えたり、血糖値が上昇したりする場合があります。
- そのため、糖尿病の方や糖尿病と診断された経験のある方は、このお薬を服用できません。
- また、次のような方は糖尿病になりやすい方ですので、必ず服用前に主治医または薬剤師にご相談ください。
 - ご家族に糖尿病の方がいる
 - 肥満の傾向がある
 - 血糖値が高いといわれたことがある
 - 体重が増加傾向にある

次のような症状があらわれたら主治医にご相談ください

血糖値が高くなると、以下のような症状があらわれることがあります。

激しくのどが渇き、
大量の水分をとる

おしっこに行く
回数が増える、
おしっこの量が多くなる



急に体重が
減ってくる

- 上記のような症状があらわれても放置しておくと、急に倒れてしまうことがあるので注意が必要です。
- その他、気になる症状がある場合は、主治医または薬剤師にご相談ください。



Meiji Seika ファルマ株式会社

ZY000603©
(A)
改訂:2021.5

このお薬を服用する前にご確認ください

- このお薬を服用している間、体重が増えたり、血糖値が上昇したりする場合があります。
- そのため、糖尿病の方や糖尿病と診断された経験のある方は、このお薬を服用できません。
- また、次のような方は糖尿病になりやすい方ですので、必ず服用前に主治医または薬剤師にご相談ください。
 - ご家族に糖尿病の方がいる
 - 肥満の傾向がある
 - 血糖値が高いといわれたことがある
 - 体重が増加傾向にある

次のような症状があらわれたら主治医にご相談ください

血糖値が高くなると、以下のような症状があらわれることがあります。

激しくのどが渇き、
大量の水分をとる

おしっこに行く
回数が増える、
おしっこの量が多くなる



急に体重が
減ってくる

- 上記のような症状があらわれても放置しておくと、急に倒れてしまうことがあるので注意が必要です。
- その他、気になる症状がある場合は、主治医または薬剤師にご相談ください。



Meiji Seika ファルマ株式会社

ZY000603©
(A)
改訂:2021.5

このお薬を服用する前にご確認ください


- このお薬を服用している間、体重が増えたり、血糖値が上昇したりする場合があります。
- そのため、糖尿病の方や糖尿病と診断された経験のある方は、このお薬を服用できません。
- また、次のような方は糖尿病になりやすい方ですので、必ず服用前に主治医または薬剤師にご相談ください。
 - ご家族に糖尿病の方がいる
 - 肥満の傾向がある
 - 血糖値が高いといわれたことがある
 - 体重が増加傾向にある

次のような症状があらわれたら主治医にご相談ください

血糖値が高くなると、以下のような症状があらわれることがあります。

激しくのどが渇き、
大量の水分をとる

おしっこに行く
回数が増える、
おしっこの量が多くなる



急に体重が
減ってくる

- 上記のような症状があらわれても放置しておくと、急に倒れてしまうことがあるので注意が必要です。
- その他、気になる症状がある場合は、主治医または薬剤師にご相談ください。



Meiji Seika ファルマ株式会社

ZY000603©
(A)
改訂:2021.5