


配合変化試験表



日本標準商品分類番号 876135

薬価基準収載

ホスホマイシン系抗生物質製剤

処方箋医薬品^{注)}

日本薬局方 注射用ホスホマイシンナトリウム

ホスミシン[®]S 静注用0.5g

ホスミシン[®]S 静注用1g

ホスミシン[®]S 静注用2g

FOSMICIN[®]-S FOR INJECTION

注) 注意－医師等の処方箋により使用すること

ホスミシン[®]S静注用の配合変化試験

1 配合薬剤

市販の注射剤70品目を選択した。それらの薬剤の品名、製造販売元及び含量等については試験結果表に記載した。

2 配合試験

(1) 配合方法

- I. ホスミシン[®]S静注用1gを配合薬(20mL以下の液剤あるいは粉末製剤)と混合し、注射用蒸留水を加えて全量20mLに調製する。
 - II. ホスミシン[®]S静注用1gを配合薬(20mL以上の液剤あるいは粉末製剤)と混合し、注射用蒸留水を加えて全量20mLに調製する。
 - III. ホスミシン[®]S静注用1gを配合薬(液剤あるいは粉末製剤)と混合し、5%ブドウ糖類を加えて全量100mLに調製する。
 - IV. ホスミシン[®]S静注用1gを配合薬(液剤あるいは粉末製剤)と混合し、生理食塩水を加えて全量100mLに調製する。
 - V. ホスミシン[®]S静注用1gを配合薬(液剤あるいは粉末製剤)と混合し、注射用蒸留水を加えて全量100mLに調製する。
 - VI. ホスミシン[®]S静注用2gを配合薬(20mL以下の液剤あるいは粉末製剤)と混合し、注射用蒸留水を加えて全量20mLに調製する。
- *. その他の方法として備考欄に記載した。

(2) 保存条件

各試料を室温に24時間保存し、配合直後、1、3、6 及び24時間後に各測定項目について検討した。

(3) 測定項目及び測定方法

- 1) 外 観：色調の変化、濁り、沈殿の生成を肉眼で観察した。
- 2) pH：日局一般試験法のpH測定法により測定した。
- 3) 力価残存率：日局ホスホマシナトリウムの力価試験

3 試験実施施設と試験期間

明治製菓株式会社(現 Meiji Seika ファルマ株式会社) 医薬研究所
1976年5月～2008年2月

4 表の見方

配合薬剤名 ¹⁾		製造販売元 ¹⁾		配合方法 ²⁾		配合直後の成績		配合直後と比較した評価 ³⁾		配合24時間 経過後の成績	
分類	品 名 (製造販売元)	含 量	配合方法 ²⁾	測定項目	測定時間					備 考	
					配合直後	1時間後	3時間後	6時間後	24時間後		
中枢神経用薬	 (Meiji Seika ファルマ)	25mg 1mL 1管	I	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	無色澄明		
				pH	6.45				6.45		
				残存率 (%)	95				95		
	 (Meiji Seika ファルマ)	1% 5mL 1管	I	外観	無色澄明	(-)	(-)	微黄色澄明	微黄色澄明		
				pH	7.5	7.5		6.3	6.2		
				残存率 (%)	100	100		96	95		

薬効分類名

外観に変化が認められた場合あるいは残存率が90%以下に低下した場合には、全体に網掛けをしています。

薬効分類名 外観に変化が認められた場合あるいは残存率が90%以下に低下した場合には、全体に網掛けをしています。

1) 配合薬剤名及び製造販売元会社名は2025年1月現在の名称で記載しました。
2) 上記「2. 配合試験 (1) 配合方法」を参照
3) (-)：配合直後と比較し、変化なし



ホスミン®S静注用1gを20mLに溶解した場合(静注内注射用)

分類	品名 (製造販売元)	含量	配合方法	測定項目	測定時間					備考
					配合直後	1時間後	3時間後	6時間後	24時間後	
中枢神経用薬	アタラックス-P注射液 (ファイザー)	25mg 1mL 1管	I	外観	(+)白色沈澱	(+)	(+)	(+)	(+)	外観：白色沈澱を生じ1時間後から膜状沈澱を生じた
				pH	7.55	7.55	7.55	7.55	7.55	
				残存率(%)	100	102	101	98	105	
	コントミン筋注50mg (田辺三菱製薬)	1% 5mL 1管	I	外観	(+)白色沈澱	(+)	(+)	(+)	(+)	外観：白色沈澱を生じ1時間後から膜状沈澱を生じた
				pH	7.45	7.45	7.40	7.40	7.40	
				残存率(%)	100	105	107	102	98	
	ソセゴン注射液15mg (丸石製薬)	15mg 1管	I	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.55	7.60	7.60	7.60	7.60	
				残存率(%)	100	101	102	101	100	
催眠鎮静剤	フェノバル注射液100mg (藤永製薬)	10% 1mL 1管	I	外観	(土)無色 わずかに油滴	(+)白色沈澱	(+)	(+)	(+)	外観：わずかに油滴を生じ、1時間後から白色沈澱を生じた
				pH	7.50	7.65	7.70	7.65	7.50	
				残存率(%)	100	98	106	104	100	
局所麻酔剤	キシロカイン注射液2% (サンドファーマ)	2% 1mL バイアル	I	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.40	7.40	7.40	7.45	7.45	
				残存率(%)	100	100	98	97	96	
末梢神経用薬	ブスコパン注20mg (サノフィ)	2% 1mL 1管	I	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.50	7.55	7.55	7.55	7.40	
				残存率(%)	100	96	103	99	95	
循環器官用薬	アミサリン注100mg (アルフレッサファーマ)	10% 1mL 1管	I	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.60	7.60	7.60	7.60	7.55	
				残存率(%)	100	100	96	102	101	
	安息香酸Naカフェイン注 100mg「フソー」 (扶桑薬品工業)	10% 1mL 1管	I	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.60	7.60	7.60	7.60	7.65	
				残存率(%)	100	100	103	106	101	
	グリセオール注 (太陽ファルマ)	500mL 1袋	*	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	*: FOMS2gをグリセオール500mLで溶解
				pH	7.41	7.37	7.38	7.38	7.37	
				残存率(%)	100	98	98	97	96	
	ドブトレックス注射液100mg (共和薬品工業)	5mL 1管	*	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)		*FOMS1g/20mLとドブトレックス1mg/100mLを混合
				pH	7.65	7.62	7.64	7.66		
				残存率(%)	100	99	99	99		
	ネオフィリン注250mg (エーザイ)	2.5% 10mL 1管	I	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	8.65	8.65	8.65	8.65	8.70	
				残存率(%)	100	98	98	102	97	
	ラシックス注20mg (サノフィ)	1% 20mg 1管	I	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.70	7.65	7.60	7.60	7.50	
				残存率(%)	100	103	102	106	105	
呼吸器官用薬	ビソルボン注4mg (サノフィ)	4mg 1管	I	外観	(+)白色沈澱	(+)	(+)	(+)	(+)	外観：配合直後に白色沈澱を生じた
				pH	7.55	7.55	7.55	7.55	7.50	
				残存率(%)	100	106	105	104	106	
	テラプチク静注45mg (エーザイ)	1.5% 3mL 1管	I	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.50	7.55	7.55	7.55	7.40	
				残存率(%)	100	100	94	95	99	
消化性潰瘍用薬	プリンペラン注射液10mg (日医工)	0.5% 2mL 1管	I	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.60	7.60	7.60	7.55	7.55	
				残存率(%)	100	106	98	98	101	

／：未測定

分類	品 名 (製造販売元)	含 量	配合 方法	測定項目	測定時間					備 考
					配合直後	1時間後	3時間後	6時間後	24時間後	
副腎ホルモ ン剤	水溶性プレドニン10mg (シオノギファーマ)	10mg 1mL バイアル	I	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.55	7.55	7.55	7.55	7.55	
				残存率 (%)	100	100	99	99	102	
	ソル・コーテフ注射用100mg (ファイザー)	100mg 1瓶 (溶解液付)	I	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.55	7.55	7.55	7.55	7.55	
				残存率 (%)	100	101	102	99	98	
	デカドロン注射液3.3mg (サンドファーマ)	3.3mg 1mL 1バイアル	I	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	
				残存率 (%)	100	100	99	96	95	
	ノルアドレナリン注1mg (アルフレッサファーマ)	0.1% 1mL 1管	I	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.55	7.55	7.55	7.55	7.55	
				残存率 (%)	100	97	99	96	97	
	リンデロン注4mg(0.4%) (シオノギファーマ)	4mg 1管	I	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	
				残存率 (%)	100	100	102	102	101	
ビ タ ミ ン B ₁ 剤	アリナミンF50注 (武田テバ薬品)	50mg 20mL 1管	II	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.35	7.35	7.35	7.40	7.30	
				残存率 (%)	100	100	100	98	95	
ビ タ ミ ン B 剤	ケイツー N静注10mg (エーザイ)	10mg 2mL 1管	I	外観	微黄色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.40	7.40	7.40	7.45	7.35	
				残存率 (%)	100	100	100	101	102	
	シーパラ注 (高田製薬)	2mL 1管	I	外観	黄色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.50	7.50	7.50	7.50	7.40	
				残存率 (%)	100	98	97	101	103	
	ビタメジン静注用 (アルフレッサファーマ)	1瓶	I	外観	紅色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	
				残存率 (%)	100	94	95	96	93	
	フラビタン注射液20mg (トアエイヨー)	20mg 2mL 1管	I	外観	微黄褐色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.40	7.40	7.40	7.45	7.35	
				残存率 (%)	100	100	100	103	100	
滋 養 強 壮 薬	カルチコール注射液8.5% 10mL (日医工)	8.5% 2mL 1管	I	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.35	7.40	7.40	7.40	7.40	
				残存率 (%)	100	100	100	96	100	
	フェジン静注40mg (日医工)	40mg 2mL 1管	I	外観	黒色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.50	7.50	7.50	7.55	7.55	
				残存率 (%)	100	100	96	100	96	
糖 類 剤	マルトス輸液10% (大塚製薬工場)	10% 500mL 1瓶	II	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.65	7.65	7.70	7.65	7.60	
				残存率 (%)	100	99	97	99	102	
止 血 剤	アドナ注(静脈用) 25mg (ニプロESファーマ)	0.5% 5mL 1管	I	外観	淡橙赤色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.35	7.35	7.35	7.35	7.45	
				残存率 (%)	100	100	100	100	98	
血 液・ 体 液 用 薬	ヴィーンD輸液 (扶桑薬品工業)	500mL 1袋	*	外観	無色澄明		(-)	(-)	(-)	試料調製：FOMS 2gをヴィーンD注 200mLで溶解
				pH	7.16		7.14	7.12	7.16	
				残存率 (%)	100		99.1	98.8	99.7	

／：未測定



分類	品名 (製造販売元)	含 量	配合方法	測定項目	測定時間					備 考
					配合直後	1時間後	3時間後	6時間後	24時間後	
血液・体液用薬	EL-3号輸液 (エイワイファーマ)	500mL 1瓶	II	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	6.70	6.70	6.70	6.70	6.75	
				残存率 (%)	100	100	100	98	100	
	KN3号輸液 (大塚製薬工場)	500mL 1瓶	II	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45	
				残存率 (%)	100	100	100	98	96	
	YDソリタ-T3号輸液 (陽進堂)	500mL 1瓶	II	外観	微黄色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.30	7.30	7.40	7.30	7.50	
				残存率 (%)	100	100.1	100.3	99.9	100.6	
	ソルデム3A輸液 (テルモ)	200mL 1袋	*	外観	黄色澄明		(-)	(-)	(-)	試料調製：FOMS 2gをソルデム3A 200mLで溶解
				pH	7.46		7.45	7.43	7.46	
				残存率 (%)	100		101.1	100.7	99.6	
	トランサミン注5% (第一三共)	10% 2.5mL 1管	I	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.40	7.40	7.40	7.25	7.45	
				残存率 (%)	100	100	100	98	97	
	ラクテックG輸液 (大塚製薬工場)	500mL 1瓶	II	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	
				残存率 (%)	100	100	100	100	105	
	リングル液「フソー」 リングル液「オーツカ」 (扶桑薬品工業、大塚製薬工場)	500mL 1瓶	II	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.50	7.50	7.50	7.50	7.45	
				残存率 (%)	100	100	100	99	99	
高カロリーたん白アミノ酸製剤	ピーエヌツイン-1号 (エイワイファーマ)	1000mL 1キット	*	外観	黄色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	*：FOMS2gをピーエ ヌツイン-1号1000mLで 溶解しこの溶液にM.V.I. -12キット10mL、エレメ ンミック2mLを混合
				pH	5.54	5.54	5.52	5.49	5.44	
				残存率 (%)	100	99.8	98.9	99.4	99.8	
	ピーエヌツイン-2号 (エイワイファーマ)	1000mL 1キット	*	外観	黄色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	*：FOMS2gをピーエ ヌツイン-2号1100mLで 溶解し、この溶液にM.V.I. -12キット10mL、エレメ ンミック2mLを混合
				pH	5.57	5.55	5.53	5.50	5.47	
				残存率 (%)	100	99.8	99.6	99.6	98.9	
	エレメンミック注 (エイワイファーマ)	2mL 1アンプル	*	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	*：FOMS2gをピー エヌツイン-2号 1100mLで溶解
				pH	5.57	5.56	5.55	5.51	5.50	
				残存率 (%)	100	100.2	99.3	99.1	99.1	
その他の代謝性医薬品	アデホスLコーワ注 40mg (興和)	40mg 1管	I	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.65	7.65	7.65	7.70	7.60	
				残存率 (%)	100	100	100	95	99	
	タチオン注射用 100mg (長生堂製薬)	100mg 1管 (溶解液付)	I	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.50	7.50	7.50	7.50	7.40	
				残存率 (%)	100	100	97	95	95	
	メイロン静注7% (大塚製薬工場)	7% 50mL 1管	II	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.90	8.00	8.10	8.20	8.30	
				残存率 (%)	100	98	92	98	96	
細胞脂活用薬	ロイコン注射液 20mg (大原薬品工業)	1% 2mL 1管	I	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	
				残存率 (%)	100	100	106	102	101	

／：未測定

分類	品名 (製造販売元)	含量	配合方法	測定項目	測定時間					備考
					配合直後	1時間後	3時間後	6時間後	24時間後	
抗悪性腫瘍剤	5-FU注250mg (協和キリン)	250mg 1管	I	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	8.40	8.45	8.45	8.50	8.55	
				残存率 (%)	100	103	97	102	106	
	オンコビン注射用 1mg (日本化薬)	1mg 1瓶 (溶解液付)	I	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.50	7.50	7.50	7.55	7.60	
				残存率 (%)	100	99	99	99	100	
	ダウノマイシン静注用20mg (Meiji Seika ファルマ)	20mg 1瓶	I	外観	赤色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.55	7.60	7.60	7.60	7.60	
				残存率 (%)	100	96	95	98	95	
	注射用エンドキサン 100mg (塩野義製薬)	100mg 1瓶	I	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.60	7.55	7.55	7.55	7.50	
				残存率 (%)	100	103	98	103	100	
	ニドラン注射用25mg (アルフレッサファーマ)	25mg 1瓶	*	外観	白色針状結晶析出		(+)	(+)	(+)	試料調製：FOMS2g/ 20mL生食とニドラン 125mg/40mL注射用水 を混合 外観：配合直後から白色 針状結晶が析出した
				pH	7.21		7.18	7.17	7.21	
				残存率 (%)	100		101.4	101.1	100.1	
	パラプラチン注射液50mg (チェプラファーム)	50mg 5mL 瓶	*	外観	無色澄明		(-)	(-)	(-)	試料調製：FOMS 2g/20mL生食とパ ラプラチン50mg/ 5mL注射用水を混合
				pH	7.31		7.28	7.28	7.31	
				残存率 (%)	100		99.8	100.7	102.2	
	ピシバニール注射用0.2KE (中外製薬)	0.2KE 1瓶 (溶解液付)	I	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.45	7.45	7.45	7.50	7.55	
				残存率 (%)	100	98	98	95	99	
	ブレオ注射用 5mg (日本化薬)	5mg 1管	I	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.55	7.55	7.60	7.60	7.60	
				残存率 (%)	100	98	100	97	104	
	マイトマイシン注用2mg (協和キリン)	2mg 1管	I	外観	淡紫色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.50	7.55	7.55	7.55	7.55	
				残存率 (%)	100	105	100	97	101	
	ランダ注10mg/20mL (日本化薬)	10mg 20mL瓶	*	外観	無色澄明		(-)	(-)	(-)	試料調製：FOMS 2g/20mL生食とラ ンダ10mg/20mL 注射用水を混合
				pH	7.32		7.29	7.28	7.32	
				残存率 (%)	100		98.7	98.8	99.4	
抗生物質	塩酸バンコマイシン 点滴静注用0.5g (大蔵製薬)	500mg 1バイアル	*	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	試料調製：FOMS 2gをVCM0.5gを 100mL注射用水で 溶解した溶液で溶解
				pH	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	
				残存率 (%)	100	100	100	100	100	
	カルベニン点滴用0.5g (第一三共)	0.5g 1バイアル	VI	外観	淡黄色澄明		(-)	(-)	黄色透明	外観：24時間後まで に黄色透明に変化し た
				pH	7.34		7.32	7.34	7.38	
				残存率 (%)	100		99.7	98.9	97.5	
	ゲンタシン注40 (高田製薬)	40mg 1管	I	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.50	7.50	7.50	7.50	7.40	
				残存率 (%)	100	103	96	99	102	
	セファメジンα注射用0.25g (LTLファーマ)	250mg 1瓶	I	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.60	7.55	7.60	7.60	7.50	
				残存率 (%)	100	106	102	105	102	

／：未測定



分類	品名 (製造販売元)	含量	配合方法	測定項目	測定時間					備考
					配合直後	1時間後	3時間後	6時間後	24時間後	
抗生物質	チエナム点滴静注用0.5g (MSD)	500mg 1mL バイアル	Ⅵ	外観	淡黄色懸濁		(+)	(++)	黄色懸濁	外観：完全に溶解せず懸濁状態となり静置すると沈殿した。経時着色が認められた
				pH	7.4		7.4	7.4	7.4	
				残存率 (%)	100		102	101	102	
	エリスロシン点滴静注用500mg (ヴィクトリア・ヘルスケア)	300mg 1瓶	Ⅰ	外観	白色沈殿	(+)	(+)	(+)	(+)	外観：配合直後に白色沈殿を生じた
				pH	7.55	7.50	7.50	7.45	7.55	
				残存率 (%)	100	104	104	107	107	
	ビクシリン注射用0.5g (Meiji Seika ファルマ)	500mg 1瓶	Ⅰ	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	8.00	7.90	7.90	7.90	7.90	
				残存率 (%)	100	98	97	100	105	
	注射用ビクシリンS1000 (Meiji Seika ファルマ)	1g 1瓶	Ⅰ	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.90	8.00	8.00	8.00	7.90	
				残存率 (%)	100	100	101	103	101	
	注射用ペニシリンGカリウム20万単位 (Meiji Seika ファルマ)	20万単位 1瓶	Ⅰ	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.55	7.55	7.55	7.55	7.60	
				残存率 (%)	100	98	99	97	104	
	ミノマイシン点滴静注用100mg (ファイザー)	100mg 1瓶	Ⅰ	外観	黄色沈殿	(+)	(+)	(+)	(++)	外観：配合直後に黄色沈殿を生じ、24時間後は褐色沈殿となった
				pH	7.15	7.20	7.20	7.20	7.20	
				残存率 (%)	100	107	100	103	102	
	トブラシン注60mg (東和薬品)	60mg 1管	Ⅰ	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.50	7.50	7.50	7.50	7.40	
				残存率 (%)	100	100	101	105	104	
	パニマイシン注射液100mg (Meiji Seika ファルマ)	100mg 1管	Ⅰ	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.50	7.50	7.50	7.50	7.55	
				残存率 (%)	100	98	97	97	99	
	ゾシン静注用4.5(生食) (大鵬薬品工業)	4.5g 20mL バイアル	*	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	試験調製：FOMS1gを大塚生食注50mLで溶解、別にゾシン静注用4.5gを大塚生食50mLで溶解し、両液を混合
				pH	7.54	7.51	7.49	7.44	7.30	
				残存率 (%)	100	99.5	96.6	99.2	98.1	
	ゾシン静注用4.5(糖液5%) (大鵬薬品工業)	4.5g 20mL バイアル	*	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	微黄色澄明	試験調製：FOMS1gを大塚糖液5%50mLで溶解、別にゾシン静注用4.5gを大塚糖液5%50mLで溶解し、両液を混合 外観：24時間後までに微黄色澄明に変化した
				pH	7.61	7.58	7.51	7.46	7.26	
				残存率 (%)	100	100.3	99.5	98.5	97.7	
	カナマイシン硫酸塩注射液1g「明治」 (Meiji Seika ファルマ)	1g 1管	Ⅰ	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.20	7.20	7.20	7.20	7.25	
				残存率 (%)	100	101	100	103	104	
	リンコシン注射液300mg (ファイザー)	300mg 1mL バイアル	Ⅰ	外観	無色澄明	(-)	(-)	(-)	(-)	
				pH	7.55	7.40	7.45	7.40	7.45	
				残存率 (%)	100	101	107	101	102	

／：未測定

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1.2 心不全、腎不全、高血圧症等ナトリウム摂取制限を要する患者

本剤は14.5mEq/g(力価)のナトリウムを含有する。[8.3、9.8参照]

ホスミン®S静注用添付文書2023年7月改訂(第1版)より

※電子化された添付文書の改訂に十分ご留意ください。

その他詳細につきましては、電子化された添付文書をご参照ください。

ホスミシン[®]S静注用1gを100mLに溶解した場合(点滴静注内注射)力価%：上段－ホスミシン[®]S静注用 下段－被検薬剤

分類	品 名 (製造販売元)	含 量	配合 方法	測定項目	測定時間					備 考
					配合直後	1時間後	3時間後	6時間後	24時間後	
抗生物質	注射用パニマイシン100mg (Meiji Seika ファルマ)	50mg 1瓶	Ⅲ	外観	無色澄明	(－)	(－)	(－)	(－)	
				pH	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	
				残存率(%)	100 100	103 99	101 103	92 103	102 92	
			Ⅳ	外観	無色澄明	(－)	(－)	(－)	(－)	
				pH	7.70	7.70	7.70	7.75	7.70	
				残存率(%)	100 100	102 103	100 102	106 101	106 101	
			Ⅴ	外観	無色澄明	(－)	(－)	(－)	(－)	
				pH	7.60	7.60	7.55	7.50	7.55	
				残存率(%)	100 100	99 100	99 99	101 99	102 99	
	アミカシン硫酸塩注射液 100mg「明治」 (Meiji Seika ファルマ)	100mg 1瓶	Ⅲ	外観	無色澄明	(－)	(－)	(－)	(－)	
				pH	7.70	7.70	7.70	7.70	7.65	
				残存率(%)	100 100	102 103	98 99	93 99	102 81	
			Ⅳ	外観	無色澄明	(－)	(－)	(－)	(－)	
				pH	7.70	7.70	7.70	7.70	7.65	
				残存率(%)	100 100	102 100	100 102	97 98	98 94	
			Ⅴ	外観	無色澄明	(－)	(－)	(－)	(－)	
				pH	7.59	7.60	7.58	7.60	7.60	
				残存率(%)	100 100	101 100	102 100	100 99	100 99	
	ビクシリン注射用1g (Meiji Seika ファルマ)	1g 1瓶	Ⅲ	外観	無色澄明	(－)	(－)	(－)	(－)	
				pH	8.20	8.20	8.19	8.15	7.95	
				残存率(%)	100 100	104 100	102 97	103 94	104 79	
			Ⅳ	外観	無色澄明	(－)	(－)	(－)	(－)	
				pH	8.30	8.30	8.30	8.30	8.20	
				残存率(%)	100 100	104 101	101 102	96 100	98 98	
			Ⅴ	外観	無色澄明	(－)	(－)	(－)	(－)	
				pH	7.70	7.70	7.68	7.66	7.66	
				残存率(%)	100 100	101 100	99 98	99 99	100 98	

製造販売元

Meiji Seika ファルマ株式会社

東京都中央区京橋 2 - 4 - 16

<https://www.meiji-seika-pharma.co.jp/>

〈文献請求先及び問い合わせ先〉

Meiji Seika ファルマ株式会社 くすり相談室

〒104-8002 東京都中央区京橋 2-4-16

フリーダイヤル(0120) 093-396

電話(03)3273-3539、FAX(03)3272-2438

FOM108603[®]

(AI)

改訂：2025.3

02M-27Y