

「使用上の注意」改訂のお知らせ

2019 年 10 月

前立腺肥大症の排尿障害改善剤

タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」

タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」

タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠

Meiji Seika ファルマ株式会社

東京都中央区京橋 2 - 4 - 16

この度、標記製品の「使用上の注意」を改訂致しますのでお知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、新しい添付文書をご参照賜りますようお願い申し上げます。

I. 改訂内容(該当部分のみ)

改 訂 後	改 訂 前								
(4)副作用 2)その他の副作用(該当部分のみ) <table><tr><th>種類\頻度</th><th>頻 度 不 明</th></tr><tr><td>過 敏 症^{注2)}</td><td>そう痒感、発疹、蕁麻疹、多形紅斑、<u>血管浮腫</u></td></tr></table> 注2)投与を中止すること。	種類\頻度	頻 度 不 明	過 敏 症 ^{注2)}	そう痒感、発疹、蕁麻疹、多形紅斑、 <u>血管浮腫</u>	(4)副作用 2)その他の副作用(該当部分のみ) <table><tr><th>種類\頻度</th><th>頻 度 不 明</th></tr><tr><td>過 敏 症^{注2)}</td><td>そう痒感、発疹、蕁麻疹、多形紅斑</td></tr></table> 注2)投与を中止すること。	種類\頻度	頻 度 不 明	過 敏 症 ^{注2)}	そう痒感、発疹、蕁麻疹、多形紅斑
種類\頻度	頻 度 不 明								
過 敏 症 ^{注2)}	そう痒感、発疹、蕁麻疹、多形紅斑、 <u>血管浮腫</u>								
種類\頻度	頻 度 不 明								
過 敏 症 ^{注2)}	そう痒感、発疹、蕁麻疹、多形紅斑								

_____：自主改訂による改訂箇所

II. 改訂理由 自主改訂

－お願い－

弊社医薬品にて副作用等臨床上好ましくない事象をご経験の際には、下記問い合わせ先又は弊社医薬情報担当者(MR)までご連絡の上、調査へのご協力をお願い申し上げます。

＜製品に関するお問い合わせ先＞

Meiji Seika ファルマ株式会社 くすり相談室 フリーダイヤル(0120)093-396 電話(03)3273-3539

PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)に最新添付文書情報が掲載されます。あわせてご利用下さい。