

— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。 —

「使用上の注意」改訂のお知らせ

2013年6月

アレルギー性疾患治療剤

フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「明治」 フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「明治」

一般名：フェキソフェナジン塩酸塩

Meiji Seika ファルマ株式会社

東京都中央区京橋 2 - 4 - 16

この度、標記製品の「使用上の注意」を改訂致しますのでお知らせ申し上げます。

今後のご使用に際しましては、新しい「使用上の注意」をご参照賜りますようお願い申し上げます。

I. 改訂内容（該当部分のみ）

改 訂 後	改 訂 前												
<p>(3)副作用</p> <p>1)重大な副作用(頻度不明)</p> <p>①ショック、アナフィラキシー：ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、呼吸困難、血圧低下、意識消失、血管浮腫、胸痛、潮紅等の過敏症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p> <p>②、③(省略 変更なし)</p> <p>2)その他の副作用(該当部分のみ抜粋)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種類\頻度</th> <th>頻 度 不 明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>循 環 器</td> <td>動悸、血圧上昇</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>呼吸困難、味覚異常、浮腫、胸痛、<u>月経異常</u></td> </tr> </tbody> </table>	種類\頻度	頻 度 不 明	循 環 器	動悸、血圧上昇	そ の 他	呼吸困難、味覚異常、浮腫、胸痛、 <u>月経異常</u>	<p>(3)副作用</p> <p>1)重大な副作用(頻度不明)</p> <p>①ショック、アナフィラキシー様症状：ショック、アナフィラキシー様症状があらわれることがあるので、観察を十分に行い、呼吸困難、血圧低下、意識消失、血管浮腫、胸痛、潮紅等の過敏症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p> <p>②、③(省略)</p> <p>2)その他の副作用(該当部分のみ抜粋)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種類\頻度</th> <th>頻 度 不 明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>循 環 器</td> <td>動悸</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>胸痛、呼吸困難、味覚異常、浮腫</td> </tr> </tbody> </table>	種類\頻度	頻 度 不 明	循 環 器	動悸	そ の 他	胸痛、呼吸困難、味覚異常、浮腫
種類\頻度	頻 度 不 明												
循 環 器	動悸、血圧上昇												
そ の 他	呼吸困難、味覚異常、浮腫、胸痛、 <u>月経異常</u>												
種類\頻度	頻 度 不 明												
循 環 器	動悸												
そ の 他	胸痛、呼吸困難、味覚異常、浮腫												

_____：自主改訂による改訂箇所

.....：自主改訂による削除箇所

II. 改訂理由

自主改訂

独立行政法人医薬品医療機器総合機構が管理する「医薬品医療機器情報提供ホームページ(<http://www.info.pmda.go.jp/>)」に最新添付文書情報が掲載されます。あわせてご利用下さい。