

ミルタザピン錠 30mg 「明治」

生物学的同等性に関する資料

Meiji Seika ファルマ株式会社


製品情報問い合わせ先

Meiji Seika ファルマ株式会社 くすり相談室
〒104-8002 東京都中央区京橋2-4-16
電話 (0120) 093-396 (03) 3273-3539

ミルタザピン錠 30mg「明治」の生物学的同等性試験

ミルタザピン錠30mg「明治」と標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠(ミルタザピンとして30mg)健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中ミルタザピン濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log(0.80)～log(1.25)の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認されました。

ミルタザピン錠30mg「明治」および標準製剤投与時の血漿中ミルタザピン濃度推移



【薬物動態パラメータ】

	被験者数	判定パラメータ		参考パラメータ	
		AUC _{0-72hr} (ng・hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	T _{1/2} (hr)
ミルタザピン錠30mg「明治」	39	711.0±160.6	85.1±30.7	1.6±1.3	18.6±3.2
標準製剤30mg	39	734.1±153.7	89.1±27.9	1.3±0.4	18.9±3.3

(Mean±S.D.)

注意：血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性があります。
試験は、「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」(平成24年2月29日 薬食審査発0229第10号)に基づき実施されました。