

# 水稲育苗箱専用長期持続型殺虫殺菌剤



フィプロニル	0.6%
プロベナゾール	24.0%
鉱物質微粉等	75.4%

【毒性】普通物 【有効年限】5年 【包装】1kg × 12袋

農林水産省登録 第20010号

(地域限定)

## ●特長

1. 育苗箱施用で、水稲初期・中期の主要病害虫であるいもち病、白葉枯病、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、イナゴ類、ニカメイチュウ、イネツトムシ、ウンカ類等を同時防除できます。
2. 育苗箱当り50g施用で、長期間にわたって高い効果を示すので、省力的、経済的です。

## ●適用病害虫および使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲 (箱育苗)	いもち病 もみ枯細菌病 白葉枯病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ イナゴ類 ニカメイチュウ ウンカ類 イネツトムシ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ) 1箱当り50g	緑化期～ 移植当日	1回	育苗箱の苗の上から 均一に散布する
		フィプロニルを含む農薬の 総使用回数		プロベナゾールを含む農薬の 総使用回数	
		1回		2回以内 (移植時までの処理は1回以内)	

(平成28年7月6日現在の登録内容)

## ●効果・薬害等の注意

---

- 育苗箱の苗の上から所定薬量を均一に散布し、茎葉に付着した薬剤を払い落とし、軽く散水して田植機にかけて移植する。
- 軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗などでは薬害を生ずるおそれがあるので、必ず健苗に使用する。
- 稲苗の葉がぬれていると、薬剤が付着して薬害を生ずる場合もあるので、散布直前の灌水はさける。
- 処理苗を移植する本田の整地が不均整な場合は薬害を生じやすいので、代かきはていねいに行い、移植後に田面が露出しないよう注意する。
- 処理苗を本田に移植した後は、そのまま湛水状態(湛水深3~5cm)を保ち、稲苗が活着するまで田面が露出しないよう水管理に注意する。
- 本田が砂質土壌、漏水田、未熟有機物多用田の場合には使用しない。
- 移植後、低温が続き、苗の活着遅延が予測される場合には使用をさける。
- 本剤は処理を誤ると、生育初期の葉の黄化や生育遅延などの薬害を生ずるので、所定の使用時期、使用方法を守る。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。