

水稻本田用殺菌剤

明治オリゼメート[®]リンバー[™] 粒剤

フラメトピル…………… 1.5%
 プロベナゾール…………… 8.0%
 鉱物質微粉等…………… 90.5%

農林水産省登録 第 19386 号

毒性 普通物 有効年限 5年 包装 3kg × 8袋

●特長

1. 水面施用で、水稻の二大病害、いもち病・紋枯病の同時防除が可能です。
2. いもち病、紋枯病に優れた効果を発揮します。

●適用病害および使用方法

作物名	適用病害名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲	いもち病 紋枯病 疑似紋枯症 【褐色菌核病菌】 【赤色菌核病菌】	3～4kg/10a	収穫30日前 まで	2回 以内	散布
			フラメトピルを含む農薬の 総使用回数	プロベナゾールを含む農薬の 総使用回数	
			2回以内 (育苗箱散布は1回以内)	2回以内 (移植時までの処理は1回以内)	

(平成28年7月6日現在の登録内容)

●効果・薬害等の注意

- 本剤の使用適期は出穂の3～4週間前。
- 散布にあたっては湛水状態(水深3cm以上)でまきむらのないように均一に散布し、散布後少なくとも4～5日間は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしない。
- 漏水のはげしい水田では効果の劣る場合があるので使用をさける。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 有効年月内に使用する。