

水稻本田用殺菌剤

オリゼート[®] 1キロ粒剤

プロベンゾール…………… 24.0%
鈳物質微粉等…………… 76.0%

農林水産省登録 第19541号

毒性 普通物 有効年限 5年 包装 1kg × 12袋

●特長

10a当たり1kg散布で、いもち病、もみ枯細菌病、白葉枯病に優れた効果を発揮します。

●適用病害および使用方法

作物名	適用病害名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロベンゾールを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病	1～1.3kg/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内 (移植時までの処理は1回以内)

(平成28年7月6日現在の登録内容)

●効果・薬害等の注意

- 湛水状態(湛水深3～5cm)でまきむらのないように均一に散布し、散布後少なくとも4～5日間はそのまま湛水状態を保ち、田面露出・水切れをさげ(薬害)、また散布後7日間は落水、かけ流しをしない。
- 砂質土壌、漏水田では使用しない(効果・薬害)。
- 本剤は予防的に散布した場合に有効である。葉いもち防除の使用適期は、初発7～10日前であるので、発生予察情報に注意して時期を失ないように散布する。穂いもち防除の使用適期は、出穂3～4週間前である。

- 有効年月内に使用する。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。