

水稻側条専用殺菌剤

側条オリゼメート[®] 顆粒水和剤

プロベナゾール…………… 48.0%
鈳物質微粉、界面活性剤等…………… 52.0%

農林水産省登録 第 20076 号

毒性 普通物 有効年限 3年 包装 500g × 20袋

●特長

1. 側条施用で従来のオリゼメート粒剤本田散布と同等の優れた効果が期待できます。
2. 田植(またはは種)・施肥・薬剤施用を同時におこなうことができ、極めて省力的です。

●適用病害および使用方法

作物名	適用病害名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロベナゾールを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病	500g/10a	移植時	1回	ペースト肥料に混合し 側条施肥田植機で施用する	2回以内 (移植時までの処理は 1回以内)
			湛水直播時		ペースト肥料に混合し 側条施肥は種機で施用する	

(平成28年7月6日現在の登録内容)

●効果・薬害等の注意

- 予め本剤を同重量の水に混ぜ、これをペースト肥料に加えて均一に混合し、側条施肥田植機又は側条施肥は種機で本田に施用する。
- 本剤と混合したペースト肥料は、その日のうちに使用する(分解)。
- 同一の病害を防除対象とする育苗施用薬剤とは併用しない(薬害)。

- 移植後は湛水状態(湛水深3~5cm)を保ち、稲苗が活着するまで田面が露出しないよう水管理に注意する。
- 本田が砂質土壌、漏水田、未熟有機物多用田の場合には使用しない(効果・葉害)。
- 移植後、低温が続き、苗の活着遅延が予測される場合には使用をさける。
- 有効年月内に使用する。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。