

水稻側条専用殺虫殺菌剤

明治

側条パタンオリゼメート[®] 顆粒水和剤

カルタップ (PRTR・1種).....	30.0%
プロベナゾール.....	48.0%
鈹物質微粉、界面活性剤等.....	22.0%

農林水産省登録 第21271号

【毒性】医薬用外劇物 【有効年限】5年 【包装】500g×20袋

●特長

1. 側条施用でいもち病と水稻初期害虫の同時防除が可能です。
2. 田植・施肥・薬剤施用を同時におこなうことができ、極めて省力的です。

●適用病害虫および使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲	イネミズゾウムシ イネドロオウムシ いもち病	500g/10a	移植時	1回	ペースト肥料に溶かし 側条施肥田植機で施用する

カルタップを含む農薬の 総使用回数	プロベナゾールを含む農薬の 総使用回数
6回以内 (種もみ浸漬は1回以内、 床土への混和、育苗箱への処理及び 側条施用は合計1回以内)	2回以内 (移植時までの処理は1回以内)






(平成28年7月6日現在の登録内容)


●効果・薬害等の注意

- 予め本剤を同重量の水に混ぜ、これをペースト肥料に加えて均一に混合し、側条施肥田植機で本田に施用する。
- 本剤と混用したペースト肥料は、その日のうちに使用する(分解)。
- 同一の病害虫を防除対象とする育苗箱施用薬剤とは併用しない(薬害)。

- 使用した機械を洗浄する際は、洗浄水が水路等に流入しないよう注意する。
- アルカリ性ペースト肥料との混和は有効成分が分解するおそれがあるので、混和可能が確認されているペースト肥料以外との混和はさける。
- 砂質土壌及び漏水の大きな水田での使用はさける(効果・葉害)。
- 使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

●安全使用上の注意

- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせる。使用中に身体に異常を感じた時は直ちに医師の手当を受ける。
- 薬液調整時には保護メガネを着用し、薬剤が眼に入らないように注意。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける(強い刺激性)。 
- 皮ふに付着しないように注意。皮ふに付着した場合は直ちに石けんでよく洗い落とす(強い刺激性)。
- 薬剤の調製時及び使用の際は保護クリームを使用し、農薬用マスク、不浸透性手袋、ゴム長靴、不浸透性防除衣などを着用する。作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を換える。   
- 作業時に着用していた衣服などは他と分けて洗濯する。
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しない。施用した作物などに触れない。 
- 夏期高温時は使用しない。
- 使用量に合わせ秤量し、使いきる。空容器は圃場などに放置せず適切に処理する。
- 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。
- 移送取扱いは、ていねいに行う。

治療法…カルタップにはL-システイン製剤の投与が有効(動物実験で報告)。
 魚毒性等…養魚田及び養殖池等周辺での使用はさける(魚類)。 
 甲殻類、ドジョウには特に影響を及ぼすので十分注意。
 使用後は水管理に注意する。

保管…食品と区別し、密封して直射日光をさけ、冷涼・乾燥した場所。
 カギをかける。盗難、紛失の際は警察に届け出る。

火災時の措置…火災時は適切な保護具を着用し、水・消火剤で消火に努める。