

- 主治医から指示された定期検査は欠かさず受けてください。
- ときに肝機能検査値の上昇がみられることがありますので、定期的な血液検査を受けることをおすすめします。
- ときに乳房の腫脹（はる感じ）、痛み、ほてりなどの症状が現れる場合があります。これらの症状が現れたら、主治医、薬剤師にご相談ください。

医療機関名：

Meiji Seika ファルマ株式会社

BCO000202©
(AI)
改訂：2020.11

ビカルタミドOD錠80mg「明治」 をお飲みになる方へ

監修：公益財団法人 がん研有明病院 顧問(泌尿器科) 福井 巖 先生



(実物大)

ビカルタミドOD錠80mg「明治」は、**1日1回服用**の前立腺がん治療薬です。
男性ホルモンの作用を妨げて、前立腺がん細胞の増殖を抑えます。

お薬の飲み方と注意

- 主治医の指示に従って、1日1回1錠、毎日決まった時間に飲んでください。




- 水なしで飲めるお薬です。舌の上で軽くつぶして溶かし、唾液と一緒に飲み込んでください。また、水と一緒に服用することもできます。

なお、寝たままの状態では水なしで服用しないでください。

- 飲み忘れに気づいたときにはできるだけ早く飲んでください。ただし、すぐに次の服用時間がある場合、飲み忘れた分は飲まないでください。

2回分を一度に飲まないでください。

- ご自分の判断で、服用を中止しないでください。必ず主治医の指示に従ってください。



お薬を服用中に・・・

まれに以下のような症状がでることがあります。その場合には、すぐに主治医、薬剤師にご相談ください。

- 皮膚や白目が黄色くなる



- 出血が止まりにくい、歯ぐきや鼻などから出血しやすい



- 発熱、から咳 など

