

meiji

デプロメール[®]錠25mg/50mg/75mgを お飲みになる患者様とご家族へ

落ち込んだ気持ちや不安な状態を改善するお薬が処方されています

チェック



デプロメール[®]錠25

チェック



デプロメール[®]錠50

チェック



デプロメール[®]錠75

※PTPシート、錠剤は印刷の具合により実際のものとは若干異なる場合があります。

1

かまずに水またはぬるま湯で飲んでください。
このお薬は、かむと苦味を感じます。

2

飲む量が増えても心配しないでください。
治療期間や症状に合わせて調節しています。

3

ご自分の判断で飲むのをやめないでください。
主治医の指示通りに服用してください。

分からないこと、気になることがある場合は
主治医に相談してください

他の診療科または病医院を受診される際には、
先生に本紙(このページ)をお見せください。

〈医師、薬剤師の先生方へ〉

この患者様は、デプロメール錠を
服用中です。

次の薬剤との併用は禁忌となっ
ておりますのでご注意ください。



禁 忌

- モノアミン酸化酵素(MAO)阻害剤
セレギリン塩酸塩(エフピー)
ラサギリンメシル酸塩(アジレクト)
サフィナミドメシル酸塩(エクフィナ)
- ジフェニルブチルピペリジン系抗精神病薬
ピモジド(オーラップ)
- 筋緊張緩和剤
チザニジン塩酸塩(テルネリン)
- メラトニン受容体アゴニスト(不眠症治療剤)
ラメルテオン(ロゼレム)

医療機関名