



エピシル® 口腔用液

を使用される患者さまへ

エピシル®口腔用液の使用方法




ポンプから保護キャップを取り外します。

- 初めて使用する時は、ティッシュペーパーなどに向けポンプを数回プッシュし、均一の液量が滴下されること確認してください。
- なお、本製品の内容液は、霧状ではなく**液体**で出ます。




患部に適用する際は、ノズルを患部に向け、ポンプを1回から3回プッシュしてエピシル®口腔用液を滴下塗布します。

- なお、顕著な口腔内乾燥が見られる場合は、あらかじめうがいをしてから本品を使用することをお勧めします。



適宜、舌で患部に塗り広げてください。

- 患者さまご自身での使用が困難な場合は、介助者の方が適量を口腔内に滴下してご使用ください。



塗布後、エピシル®口腔用液による保護膜が形成され、5分後から効果を発揮し、8時間効果が持続します。

本品は必要に応じて、1日に2回から3回ご使用ください。



エピシル® 口腔用液

を使用される患者さまへ

使用する際の注意

- ① 次のような方は使う前に必ず担当の医師・歯科医師あるいは薬剤師に伝えてください。
 - 薬で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
 - 妊娠しているまたは妊娠している可能性がある。
 - 赤ちゃんに母乳を与えている。
- ② 本品の成分により、塗布した部分に灼熱感や刺激を感じる場合があります。
- ③ ボトルは他の人と共用しないでください。
- ④ 使用開始後は3か月以内に使用してください。
- ⑤ 30日を超えて継続して使用しないでください。
- ⑥ 補助を必要とする小児等が使用する場合は、保護者等の監督の下に使用するか、大人が操作をしてください。

保管方法

- ① 冷蔵庫で保管しないでください。
冷所で保存すると成分が固まって液が出にくくなる恐れがあります。
- ② 小児の手の届かないところに保管してください。

