

1回目

___/___()
に飲むお薬

2回目

___/___()
に飲むお薬

ハイスタ[®]錠10mgは
1週間に2回飲むお薬です。

飲む日・飲む時間

1
回
目

___/___()

- 朝食後
- 昼食後
- 夕食後

2
回
目

___/___()

- 朝食後
- 昼食後
- 夕食後

1回に飲む量



を _____ 錠

ハイスタ[®]錠10mg 服用シート

HY000501[©]
(KK)
作成：2021.07

meiji Meiji Seika ファルマ株式会社

服用方法

- ・ 医師・薬剤師に指示された量を**1週間に2回**、**食後**に飲みます。
- ・ 服用は3又は4日間隔とします。

服用スケジュールの例

<パターン1>

1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目
服用	お休み	お休み	服用	お休み	お休み	お休み

<パターン2>

1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目
服用	お休み	お休み	お休み	服用	お休み	お休み

1週間

※ハイヤスタ錠を服用するタイミングは
担当の医師の指示に従ってください。

服用中に以下のような
症状が現れた場合は、
医療機関に連絡しましょう。

- ・あざができやすい(下肢の点状出血など)
- ・血が止まりにくい
- ・鼻血、歯ぐきからの出血
- ・発熱、せき、のどの痛み
- ・めまい、立ちくらみ
- ・動悸、息切れ

お薬はこのシートに
入れたまま
押し出してください。

