レズロック®錠を服用される方へ

1日＿回1錠

食後に服用してください。

医師に指示された量を服用するようにしてください。
ご自身の判断で服用を中止したり、
服用量や服用回数を変えたりしないでください。

- 飲み忘れに気づいた場合は、すぐに服用してください。
  ただし、翌日以降に飲み忘れに気づいた場合は、
  飲み忘れた前日までの分を余計に服用することは
  せず、その日の分だけを服用してください。



- あやまって多く服用してしまった場合は、
  すぐに主治医や看護師、薬剤師に相談してください。
- PTPシートの押し出しができない場合は薬剤師に相談してください。

健康にアイデアを
meiji Meiji Seikaファルマ株式会社

RZ003001ⓢ
(KK)
作成：2025.3
02M-27Y

レズロック®錠の副作用

■特に注意が必要な副作用

感染症

肺炎や帯状疱疹などの感染症を生じることがあります。

肺炎

発熱や咳、痰、息切れ、息苦しさといった症状があらわれることがあります。

帯状疱疹

皮膚の一部に、ズキズキ・チクチクといった針で刺されたような痛みや、赤い発疹や水疱があらわれることがあります。

■その他に注意が必要な副作用

頭痛

下痢 **悪心** 吐き気

嘔吐

筋痙縮

筋肉がぴくつく、筋肉がこわばる・つっぱる

疲労 **食欲減退**

浮腫 体がむくむ等

このような症状、あるいは、上記以外でも気になる症状がでたら、主治医や看護師、薬剤師にご連絡ください。

日常のケアや疾患に関する情報はこちらから
「造血幹細胞移植を受けられる方へ」
https://www.meiji-seika-pharma.co.jp/hsct_guide/

レズロックに関する詳細な情報はこちらから
「レズロック®錠を服用される方へ」
https://www.meiji-seika-pharma.co.jp/hsct_guide/patient/